




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2529/A/2





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2529/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2529/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2529/A/2





2529⁽²⁾/A/2


ZR/-.

A. XVIII. j

~~45~~ 4.22
1327

28018.

Payne
12/1/11



20 CLAVDII GALENI
PERGAMENI INTRO-
DVCTIO SEV MEDICVS.

DE SECTIS AD MEDICINÆ
CANDIDATOS OPVSCVLVM.

GVINTERIO IOANNE AN-
DERNACO INTERPRETE.




PARISIIS
Apud Simonem Colinaeum.

1 5 2 8

Μῶσαι Γουίντερίω πρὸς Ιάνου
Ολιβέριου.

ὦ χαῖρ' ἀνὴρ φανέσασθε
τρὶς καὶ τετάρκις καὶ πλείον,
παρῆμην ἐνταυθοῖ πείλας
Μῶσαι Γουίντέρω φίλαι
δόμεναι σοὶ ὦ ἀνδρῶν φάθος
κῦθ' οὐστ' ἀπαντᾶρ λογιᾶν
τούτως ἱατρικῆς βίβλος
Μάζω πόκα δωσόμηναι,
ἱκετεύομην κάλως ἔχης
πρὸς αὐτῶς, καὶ εὖ πηθεῖς
Παῖδες γὰρ ἐπὶ τυγχάνομην
εἶναι, μικροῖς γυμνασμέναι.
ἀλλ' εἰ παρέξῃ πλείονας
χρόνους πατὴρ ἡμᾶν Ζεὺς
λεγῶμην ἀλλότ' ἄριον.



REVERENDO IN CHRISTO
Patri Ioanni Oliuerio, Abbati sancti
Marci apud Sueffoniēses, Guinterius
Ioannes Andernacus S. D.



Vod haectenus in vo-
tis maxime nobis fu-
it, vir amplissime, id
nunc obtigisse feli-
citer, serio triūpha-
mus: Hoc est fauo-
rem tuum, & amicitiam: quam nuper,
cum Galeni cōmentarium nomini tuo
dicaſſem, obtuliſti mihi q̄ familiariter.
Vnde quidem verū eſſe cōperio, quod
à veteribus pulchre dictū eſt, literas ho-
mines reddere humanos. Quanta enim
in te eſt eruditio, eſt autē ſumma, quam
omnes admirantur & ſuſpiciunt, tanta
quoq; animi humanitas inuenitur. Vti-
nam tales ſtudioſorum patroni plures
a. iij.

hac tempestate extarēt, & nimirum ingenia non modo bona, sed etiā felicissima prodirent. Proinde pater amplissime, denuo iam, nouas has Galeni commentationes è Græco in Latinum translatas tibi appēdere statuimus: vt eodem auspicio, quo superiores, in hominum manus perueniant: animūque tuum nobis deuinctiorem reddant. Porro quātum in versione, breui licet tempore, laborarim, non facile dixero. Primū, quòd alter librorum, introductionem intellige, omnino Galeni non sit: & stilum paulo duriores referat. Deinde, quod dictionibus Galeno inusitatis abundet. Hoc autem de opere pronuntio, cuiuscunq; sit, à Galeni scriptis nunquam fere discordare, lectuq; dignum esse. Cæterum verbum verbo reddere nō curauimus: quod interpretes indifertos folere Cicero meminit. Lusimus arbitra-

tu nostro, sed vt omnia ex fide respon-
derent. Ad hæc curatum est, vt Latinæ
linguæ mundities seruaretur: quod an
effecerimus, alij iudicent. Quāquam in
huiusmodi argumento nullus quātum-
libet florētis homo facundiæ, amœnita-
tes ac gratias verborum ostentare pote-
rit, nedum ego. Tu quādo non medio-
crem animum ad bene sperandum fe-
cisti vir benignissime: has quæso lucu-
brationes læta fronte accipias, & Guin-
terium inter cliētulos tuos annumeres.

Vale Lutetiæ. Sexto Calendas
Octobres.

a.iiij.

INDEX PARTIVM HVMANI CORPO-
ris, & morborum : qui in hoc libro continentur,
eorum etiam quæ notatu digniora videbantur.
in quo sciendum est, primo numero, folium: secun-
do, paginam indicari.

A

Abscessus	28. 2
Æsculapius medicinam hominibus tradidit.	1. 1
Ægri in compita expositi.	1. 2
Æsculapius absolutam medicinā inuenit	1. 2
Ægyptij quomodo corpus diuidebant	11. 1
Affectus Methodicis curationē indicant	7. 2
Aliena defectu	5. 2
Aliena magnitudine	3. 2
Animi principatus in cerebro	15. 1
Animæ facultates	21. 2
Anguli oculorum	12. 1
Anatome quid	14. 2
Apoplexia	26. 1
Aqua inter cutem.	29. 1
Ardens febris	24. 1
Arquatus morbus	25. 1
Aristoteles	11. 1
Artes ex his quæ possūt, definitiōes sortiunt	6. 1
Articulorum vitia	33. 2
Ars quid	5. 1
Artium duplex differentia	5. 2
Artium diuisio	5. 2
Artes inuentæ à deorum filijs	1. 1
Aspera arteria	16. 2
Atheneus	7. 1
αιτιολογικόν.	7. 1
Auris	11. 2
Auricula & eius partes	11. 2

INDEX.

	B	
Brachium.		12. 2
	C	
Coxarum dolores		33. 1
Caluariæ fracturæ		40. 2
Cutis affectiones		41. 2
κοῖλον.		13. 1
Chirurgica pars		42. 1
Ceruicis steatomata		43. 2
Carcinomata		44. 1
Calx		14. 1
Cruris partes		14. 1
Costæ		13. 1
Cubitus		12. 2
Clauiculæ		12. 2
Ceruix		12. 2
Concaua		12. 1
Clysteris vsus ab ibi profectus		1. 2
Casu obseruata		1. 2
Chirurgi quatuor habent communia		4. 1
Causarum diuisio		8. 1
Causarum noticia necessaria		7. 2
Cilium		11. 2
Coclea		11. 2
Capitis partes		11. 1
Confutatio Erasistrati		10. 1
Cholera.		23. 1
Coles		18. 2
Cor		18. 2
Chilus qualis		17. 2
Cæcum intestinum		17. 1
κῶλον.		17. 1
κωνοειδής.		15. 1
Cerebrum		14. 2

INDEX

Calculorum differentia.	31. I
Caligines.	27. I
Capitis dolor internus	26. 2
Ceratoides, vulgo cornea.	15. 2
D	
Dux neruorum species	15. I
Dentes	16. 2
Dexter cordis ventriculus	18. 2
Duo nostræ generationis principia	10. I
Duplex curationis species apud methodicos	3. 2
Duplex alienum	3. 2
Discrimen inter methodicos & rationales	4. I
Dogmatici	2. I
Digiti	12. 2
Digiti quinque	14. I
E	
Elephantiasis morbus	33. 2
Empiricæ hæreseos notæ	3. I
Empirici à compertis ad incôperta transeunt	3. I
Empirici, auxiliorû facultates negligunt	3. I
Empirici	2. I
Erasistrato medicina quid dicatur	5. I
Empiricæ sectæ authores	4. I
Elementorum qualitates	10. 2
Elementa	22. I
Επιγλώττις asperâ arteriam cooperit	17. 2
Exigua lingua επιγλώττις.	16. I
F	
Fluxus	32. I
Fauces	17. I
Figura	16. 2
Fel	18. I
Febris	22. 2
Febrium differentia	22. 2. & 23. I

INDEX.

Frons		II. 1
Fauces		II. 2
Fibra		II. 2
Femora.		14. 1
	G	
Genua		14. 1
Gurgulio		16. 2
	H	
Humor à capite		27. 2
Hydropis cuiusque causa		29. 2
Humores oculorum		16. 1
Hippo. duas tantum oculorum tunicas cognouit		15. 2
Humores quatuor ex prima generatione		21. 1
Hominem ex quatuor constare elementis		9. 2
Humores quatuor humanum corpus constituent		9. 2
Humanum corpus triplici constat substantia		10. 1
Hippocrates consummatam medicinam apud graecos protulit		1. 2
Herbarum & medicamentorum experimenta ante inuentam medicinam.		1. 1
Humerus		12. 2
Hypotenar		13. 1
	I	
Impetigines		33. 2
Ilia	13. 1	Index
Interseptum.		12. 1
Iris		12. 1
In corpore aliena loco		3. 2
ὕγιανόν.		7. 1
Intestinatorum morbi		25. 2
Intestinum medium		18. 1
Intestinum rectum		17. 1
Intestinum tenuius		17. 1
Iciunum.		17. 1

INDEX.

Intestinorum leuitas.	32. 2
Intestinorum tormina	32. 1
Inuenta ex cadauerum refectione.	1. 2
L	
Longi morbi	26. 2
Lethargus	27. 2
Lapis in vesica	30. 2
Lumborum morbi	33. 1
Leuce	34. 1
Lingua	16. 1
Lien	18. 1
Lepra	33. 2
M	
Membra fracta	45. 2
Morbus comitialis	26. 2
Melancholia	27. 1
Meatus oculorum	15. 1
Morbi præcauendi	22. 1
Morborum causæ	22. 1
Medicina trifariam diuiditur	9. 1
Meatus auditorius	11. 2
Medicinæ finē in medēdo nōdū innotescere	5. 2
Medicina quid Hippocrati dicatur	6. 1
Medicina quid recentioribus	6. 1
Medicina Herophilo quid dicatur	6. 1
Medicinæ partes primariæ	6. 2
Methodicorum affectus	3. 2
Methodicæ sectæ & mores	4. 1
Medicinæ comprehensiones ad vitæ commoditatē tem pertinent	5. 2
Medicina ars coniecturalis	5. 2
Medicinæ initium primum natura est	2. 1
Medicinæ principia tria	2. 1
Methodici	2. 1

INDEX.

Medicorum sectæ tres	2. I
Methodica quorum sit cōtemplatrix.	3. I
Malæ seu genæ	12. I
Maxillæ	12. 2
Mentum	12. 2
Μύσας.	12. 2
Medius digitus	13. I
Medicinalis digitus.	13. I
Minimus digitus	13. I
Musculi.	17. I
N	
Nares	12. I
Nasus	12. I
Nigrum oculi	12. I
Notæ sectæ rationalis.	2. 2
Notæ hæresis methodicorum	4. I
Naturæ actiones	21. 2
Nutrimenti vasa & instrumenta	16. 2
O	
Oculorum affectus	36. 2
Oculorum tunice	15. 2
ὄσχεον.	18. 2
ὄψεσχος.	19. I
Ossium anatome.	19. I
Occiput	11. 2
Oculi	11. 2
Oculi candidum	12. I
Os	12. 2
Omentum.	13. I
Os pectorale	13. I
P	
Podagra	33. I
Præfagiendi pars medicinæ necessaria.	8. 2

INDEX.

Physiologia pars quibus constet	7. 1
Pedes, & eorum partes	14. 1
Poplites	14. 1
Posteriores corporis partes	13. 2
Peritonæon	13. 1
Præcordia	13. 1
Pectus	13. 1
Pecten	13. 1
Φάριγγ.	17. 1
Pollex	13. 2
Partes manus	12. 2
Palma	12. 2
Pinnulæ seu alæ	12. 1 & 13. 2
Pupilla	12. 1
Pilorum, qui in cilijs sunt, vsus	12. 1
Palpebræ seu genæ	11. 2
Pinna	11. 2
Praxagoras & Herophilus morborum causas hu- midis attribuerunt	10. 2
Pulmonis vitium	24. 2
Pleuritis	24. 2
Plenitudinis notæ	22. 2
Πύλον.	14. 2
Planta	14. 2
Pecten pedis	14. 2
Processus narium	15. 1
Περικεράνεον.	15. 2
Palpebræ	16. 1
πυλωρὸς	16. 2
Παρίσθμια.	16. 1
Pulmones	16. 2
Pfora	34. 1
Quod extrinsecus incidit simplex est.	3. 2

INDEX.

Quare à rerum natura incipiendum. 9. 1

R

Rationalis sectæ authores 4. 1

Rerum naturæ cognitio necessaria. 7. 2

Rationalibus curationem causæ indicant 7. 2

Radius 12. 2

Recrementorū sanguineæ generationis concepta-
cula 18. 1

Respiratio 22. 1

Rhagoides 15. 2

Renes affecti 30. 1

S

Scientiæ definitio 5. 1

Σημωτικόν. 7. 2

Stomachus intestinorum principium 31. 1

Spinalis medulla 15. 2

Stomachus 16. 2

Stomachi functiones 17. 1

Σφαγίτιδες. 18. 2

Scrotum 18. 2

Sensus quinque 21. 2

Sanitas in quibus consistit 22. 1

Sanus homo quis 22. 1

Sanitas confirmanda. 22. 1

Spiritus tres 10. 1

Spiritus cuncta penetrans 10. 2

Sinciput 11. 1

Supercilia 11. 2

Scapulæ 12. 2 Sura 14. 1

Στένον. 13. 1

Stomachi affectus 25. 1

T

θεραπευτικόν. 7. 2

Ταχός. 14. 1

INDEX.

Talus	14. 1
Tibia	14. 1
Thorax	13. 1
Tempora	11. 2
Testiculi	18. 2
Triplex innatus spiritus	21. 2
Trachea arteria	17. 2
Tonsillæ	16. 1
Tribus rebus animantium vitā seruari	16. 1
Tenesmus	32. 2
Tubercula alarum	43. 2
Tetanus	26. 1
Tabes.	29. 1


V

Vitiligo	34. 1
Vertigines.	27. 1
Vesicæ affectus	30. 2
Ventris vitia	31. 2
Vifus	16. 2
Ventriculus	16. 2
Ventriculi officium	17. 2
Ventriculus alimentum ieiuno per pilæron instil-	
lat.	18. 1
Venæ sub iocinere emergentes.	18. 1
Venæ meseraicæ vim habent sanguificā.	18. 1
Vena caua	18. 2
Vreteres	18. 2
Vesica.	18. 2
Vulua	18. 2
Vertex.	11. 2
Vfus palpebrarum	11. 2
Vmbilicus	13. 1
Vola.	12. 2

FINIS.

CLAVDII GALENI
PERGAMENI INTRODVCTIO
SEV MEDICVS, GVINTERIO IOAN
NE ANDERNACO INTERPRETE.

QVOMODO INVENTA SIT
MEDICINA.



ARtiū inuēctiōnes vel deo-
rum filijs, vel quibusdam
eis propinquis, quibus dij
ipsi primum omnes illas,
artas inquam, cōmunica-
re dignati sunt, Græci fe-
runt acceptas. Hac igitur
ratione Medicinam quoq; principem Aescu-
lapiū ab Apolline patre institutū hominib;
10 bus tradidisse aiunt. Vnde eius scientiæ inuen-
tor extitisse videtur. Porro ante illum ars me-
dica nondum hominibus fuit cognita, nisi q̃
veteres medicamentorum & herbarum, quas
apud Græcos Chiron Centaurus, & ab eo eru-
15 diti heroes nouerant: Adhæc quales Aristeo,
Melampodi, & Polyido ascribuntur, experimē-
ta quædā habuere. Apud Aegyptios sanè præ-
ter herbas aliā quoq; medicamentorū rationē
in vsu fuisse, Homerus hūc in modū testatur:
20 Fertilis Aegyptus rerū, medicamina, partim
Optima mixturis, partim deterrima nutrit.

b.j.

C. GAL. PERG.

Iam vero ex cadauerum illa incisione, quam
 in exequijs habere moris erat multa etiam
 quæ manu administrantur apud priores me-
 dicos inuenta esse dicuntur. Quædam ex ca-
 su obseruata fuisse: veluti suffusis sanguinem s
 mittendum, inde quod capra quæpiam ex suf-
 fusione male habens, stipite acutissimo in o-
 culum impresso, visum receperit: Quin &
 clysteris vsum ab ibi profectum esse scribunt.
 Hæc enim collo, tanquam clysteris vtre ma- 10
 rinali quæ aqua impleto, rostri aduncitate per
 eam partem se perluit, qua recrementa red-
 di solent. Scribit etiam Herodotus historio-
 graphus quondam ægris in compita exposi-
 tis, illos qui iisdem aliquando morbis labora- 15
 rant, referre solitos quibus vnusquisq; vsum sa-
 nitatē recuperauerit. Atq; hoc modo ex mul-
 torum vsum ac experimētis rem medicam con-
 flatam esse. Sed hæc quidem experiētia ratio-
 ne vacua, nondumq; rationalis fuit. Cæterum 20
 perfectam medicinam, & omnibus numeris
 absolutam, verèq; diuinam Aesculapius solus
 inuenit. Illam vero quæ inter homines versa-
 tur, huius successores Asclepiadæ posteris ve-
 luti hæreditario acceptam tradiderunt. Maxi- 25
 mē Hippocrates, qui omnibus facile præcel-
 luit, primusque consummatam apud Græcos
 medicinam in lucem protulit.


INTROD. SEV MEDICVS. 2
QVÆ MEDICINÆ PRINCIPIA.

Pincipia medicinæ tria sunt, vnū inuentionis, Alterum cōstitutionis, Tertiū interpretationis. Inuentionis medicinæ vetustissimū planè, citràq; rationem principium experientia est: quemadmodū apud Aegyptios, reliquosque omnes barbaros. Cōstitutionis autem sicut Asclepiadum medicinæ, ratio & experientia. Interpretationis, vt scribit Athenæus, vel traditionis, quemadmodum quidam dicunt, initium, naturalis est speculatio. Hippocrates sanè breuiter, inquit, medicę rationis initium primum natura est: nam inde Dogmatici aspicantur, quoniam ex ijs quæ secundum naturam sunt, illa quæ cōtrà habent possunt cognoscere. At sine naturalium cognitione illa, quæ à naturali habitu recedunt, nemo potest. Quinetiam in curatione naturæ rationem similiter requirunt: quandoquidem ex naturali auxiliorū potentia, quæ cuilibet morbo idonea sint, accipiunt. Qui vero ex alijs sectis rerum naturæ rationem demoliuntur, vtriusque quibus præsidia adferēdi modum finxere, incipiunt. Methodici ex communi indicatione. Empirici ex obseruatione experimentorum. Qua enim ratione Dogmaticis medicæ rationis natura, eadem Empiricis experiētia cre
b.ij.

brò & ferè semper in ijsdem, & pari modo cō-
tingens, principium existit. Ab hac siquidem
historiam suam illorū quæ auditu percontan-
do didicere, exordiuntur. Adhæc ab alio ad a-
liud simile transeunt. Sed methodicis eviden- 5
tium similitudinis inspectio, vel communita-
tum apparentium cognitio principiū dicitur.

QVOT SECTÆ MEDICORVM,

QVÆQVE EARVM NOTÆ.



Ectē medicorum tres sunt: Ratio- 10
nalis, Empirica, & Methodica. Ra-
tionalis naturæ rationem præbet,
morborum causas inquit, & si-
gnis ad illarum inuentionem utitur: curatio-
nem capit à contrario, prout causæ exigunt. 15
Nam contrariorum contraria sunt remedia.
Quatuor ergo sunt quæ rationalē sectam in-
dicant: naturæ, causarum morbi, & signorū ra-
tio, postremo curationis modi indicatio. Em-
pirica ad accidentiū concursus, quæ ægris ad- 20
sunt, respicit, & cōuenientem eis curationem
obseruat, idq; nec morbo cognito, nec causa
comperta. Satis autem habet, si in accidenti-
bus, quæ usu ac experimētis didicit, adhibeat:
quæq; auditu percontando adsequuta sit: tum 2
à compertis ad incomperta, similia autem, ut
apparent specie transeat. Quæ enim ipsimet
usu ac experiētia in multis, & sæpe in ijsdē, &

INTROD. SEV MEDICVS. 3

pari modo obseruarūt: aut quæ casu quopiam
deprehenderūt eadem semper, & similia, hæc
confidenter vsurpant, non adeo curiosè, cuius-
modi sint facultatibus prædita, disquirentes.
5 Credunt vetustissimis, qui rerum per experi-
menta sibi obseruatarum, historiam vti vocāt
memoriæ prodiderūt. Vtuntur etiam à simi-
li transgressu ad ea quæ nondum explorarūt,
cum similia speciei quæ ad manum est appa-
10 rent: vt malua, blitum, teutlum, & lappatum.
Itidem in cōtrarijs, vt cartilago & oryza. Rur-
sus in omnibus arborum fructibus vt pirum,
pomum cydonium. Notant Empiricam hæ-
resim, cōcursus symptomatum, morbi, eiúsque
15 causæ ignorantia: dein medicaminum con-
uenientium per vsum cognitio: postea exper-
torū antea, collectio: nouissime à simili trans-
gressus. Methodica eorum quæ in morbis si-
milia sunt, contemplatrix est. Omnes enim
20 particulares affectus ad generales duos redu-
cunt: adstrictum, & fluētem: quæ communia
vocant. Cognoscūt ea ex obortis corpori affe-
ctionibus, in vtroque euidēter cōspicuis. Qua-
re notas non desiderant illorū, puta compres-
25 sum corpus ex densitate florisque eius reten-
tione: tum ex cuiuslibet insignis recrementi
impedimento fieri. Solutum vero ex summæ
cutis raritate, & sensilium cuiusque particulæ
b. iij.

excrementorum fusione. Duplicem igitur cu-
 rationis speciem generales duo corporis mor-
 bi ipsis indicant: nempe si corpus adstrictum
 est, digerendum esse: si profluvio laborat, com-
 primendum: si vitium mixtum habet, occur-
 rendum subinde vehementiori malo. Cate-
 rum communia omnia nominant euidencia:
 Horum affectus, adstrictum & fluēs: curatio-
 nem, resolvere & tenere: tēpora, initium, in-
 crementum, vigorem seu statum, & inclina-
 tionē. Porro medicinā, quæ manu medetur,
 communia, in eius ablatione, quod à natura
 alienum est consistit. Duplex enim alienum,
 est vel extrinsecus, vel in corpore. Extrinsecus
 rursus dupliciter, illius quod in corpore est, 51
 tres numerantur species. Atqui extrinsecus,
 vt spina, telum, & quodcunque aliud id genus
 existit, summam educationem ostēdit. Eorum
 quæ in corpore sunt, aliud loco alienum, vt
 suffusio, eluxatio, & fractura: quæ trāspositio- 20
 nem vel restitutionem in proprium locū in-
 dicant. Aliud magnitudine, vt abscessus om-
 nes, scroti tumores, verrucarum quædam ge-
 nera, quæ αρεποχορδόνες Græci vocāt, phyma-
 ta, & condilomata: quorū nonnulla diductio- 25
 ne sola vti, nōnulla summa superfluatorum ab-
 latione, demonstrantur. Aliud defectu alienū,
 non vt superuacaneum, sed veluti deficiēs, di-

INTROD. SEV MEDICVS. 4

citur, cuiusmodi mutila, & curta omnia: sicut
in labris oculisq; cernitur. Vnde quidam λα-
γωφθάλμοι, & λαγώχθλοι nominantur. Pari mo-
do etiam se habent fistulae, & profunda ulcera,
5 sinus, aliaq; huiusmodi omnia quae ex defe-
ctu repletionem desiderant. Iam vero chirur-
gi quatuor habent communia. Adhuc speciem
quam προφυλακτικήν, id est praeservatricem ap-
pellant. Apponitur autem & ipsa communi-
10 bus ad venena, & pestiferas omnes feras, quae
virus iaculantur, volatiles, terrestres, & aqua-
tiles. Nam commune omnium genus, ut sint
exitialia, non tamē ad astrictum & fluens, sed
aliud praeter haec genus referuntur. Proinde cu-
15 randi ratio alio communi, quod prophylacti-
cum vocant, continetur. Notae Methodicorum
haeresis prima similium in evidentibus con-
sideratio, sed non in latentibus seu abditis, quae
admodum rationalis sectae. Hoc vnum inter-
20 cedit discriminis, quod in illa quoque similium in-
spectio, sed in obscuris consistit. Secunda, quod
ex similibus evidentium, affectus, auxilia, tem-
pora, particularia omnia ad communia redu-
cit. Attamen non evidentibus tantum Empi-
25 ricorum more animaduertunt, sed particula-
ribus, nullo generali cognito, insistent. Ter-
tia est ex communium indicatione curatio ac-
cepta: nec caussis, ut rationalibus in usu est,

b.iiij.

C. GAL. PERG.

expositis: nec auxilijs quæ experimentis comprobata sunt, in accidētium syndrome, vt Empirici faciunt obseruatis.

QVI TRIVM SECTARVM

PRINCIPES EXTITERINT.

5



Rationalis sectæ & author, & princeps Hippocrates Cous fuit. Post hūc Diocles Carystius, Praxagoras Cous, Herophilus Chalcidoni-
us, Erasistratus Chius, Mnesitheus Athe-
neus, Asclepiades Bithynus, Cienus, qui & Prusias dictus est. Empiricæ præfuit Philinus
Cous, qui primus eam à rationali separauit,
occasione ab Herophilo suo præceptore accepta. Cum autē suam hæresim principem esse
vellent, Acronem Acragantinum quo rationali esset vetustior, ei dedisse initium dixerūt.
A Philino Serapion Alexandreus ea secta floruit. Dein Apollonij duo, pater & filius Anthioceni, hos secuti Menodotus & Sextus accuratè eam coluerūt. Methodicen Themison
Laudiceus Syrius incepit, quæ ab Asclepiade rationali deflectēs ad methodicæ sectæ inuentionē se contulit. Thessalus Trallianus eā absoluit. Post hos Mnasia, Dionysius, Proclus,
Antipatrus. In ea autē nonnihil dissenserunt Olimpiacus Milesius, Menemachus Aphrodisæus, & Soranus Ephesius. Fuerūt nonnulli

10

52

20

25

INTROD. SEV MEDICVS. 5

ἐπισυνθετικοὶ apud Græcos nominati vt Leonides Alexandreus: quidam ἐκλεκτοὶ, vt Archigenes Apameus Syrius.

MEDICINA SCIENTIA NE

5

SIT, AN ARS.



10

Rationales aliqui vt Erasistratus, medicinam partim scientiam, cuiusmodi est abditarum & morbos continentium caussarum notitia, tum euidētium & naturalium actionum, partiūmq; interiorum: Partim coniecturam vt curationem & signa, habere censuerunt. Methodici in vniuersum scientiam ipsam esse asseuerant. At vtriq; à vero, maxime methodici aberrant. Sciētia enim est conueniens, firma, & nunquam à ratione declinans cognitio: eam neque apud philosophos, præsertim dum rerum naturas perscrutātur, inuenias. Multo sanè minus in re medica: imò
20 vt verbo expediam, ne ad homines quidem venerit. Quamobrem medicina ars merito dici potest: siquidem artis nomine comprehensionum & opinionum ad finem quendam vitæ spectātium collectionē intelligimus. Comprehensiones igitur humanas, & quæ numero constitutionē quandam procreare queant, præcipue cōunitas, hoc est sibi concordēs ac consonas, cohærentesq; medicina habet: quo
25

fit, vt artis vocabulū, cuius definitio pulchrè
 ei conuenit, optimo iure commereatur. Com-
 prehensionēsq; in ea ad vitæ commoditatem
 pertinent: Quippe seruare homines saluos, &
 ægros restituere, ad vitam spectat. Sed artium **5**
 duplex est differentia: quædam à se absolutio-
 nem consequuntur, vt fabrilis, nauium com-
 pactoria, ædificatoria. Quædam finem suum
 cui scopum desiderant: cōtingunt autem non
 semper, sed plurimum. Vnde coniecturales **10**
 quoque dicuntur, ex quarum numero medi-
 cina fuerit: quemadmodum rhetorica, guber-
 natoria, & sagittandi ars. Est & alia differen-
 tia duplex: quoniam aliquæ dum fiunt, sunt:
 simulatque ab actione destiterint, nihil quod **15**
 perfecerint ostenditur: cuiusmodi saltatoria,
 cytharistica, palæstrica, & quæuis alia ars mu-
 fica. Nonnullæ in actione euident opus pla-
 nè nullum habent, sed tanquam futuri cuius-
 dam præparatoriæ existunt. Vbi vero à fun- **20**
 ctione cessauerint, tunc quid effecerint, appa-
 ret: qualis statuaria, pictoria, & fabrilis: tum
 aliæ quarum opera post actionem perdurāt.
 Inter has medicinam quoque numeres licet.
 In medendo enim nondum eius finis inno- **25**
 tescit: quippe quæ aduersus morbos semper la-
 boreat. At vbi curationem absoluerit, tunc ho-
 minis sanitatem restituisse videre est.

INTROD. SEV MEDICVS. 6

QVID SIT MEDICINA.




5 **D**efinitionibus rationales vsi sunt,
 descriptionibus Empirici: de quibus
 quæstionem instituere philo-
 sophis solum cõuenit. Quãquam
 veteres etiam medici hoc ferè mo-
 do medicinam simpliciter vel definierunt, vel
 descripserunt. **MEDICINA** est, Hippocra-
 tis sententia, adiectio & ablatio. Adiectio quia
 10 dem deficientis. Ablatio superantis in homi-
 num corporibus. Quam enim definitionem
 medicinæ nõnulli putauerunt, reuera non est,
 ægros videlicet morbis non prorsus liberare,
 dolores lenire, morbiq; vehementiam retun-
 15 dere, malo victis manum nõ admoliri. Artes
 siquidem ex his quæ possunt, definitionẽ sor-
 tiuntur, non econtrario. Quoniam illa, quæ
 neutiquã fieri possunt, recēset, non ex ijs quæ
 adsunt, artes definit. Recentiores huiusmodi
 20 definitionem vsurparunt. Medicina est scien-
 tia, sanitatis conseruatric, morborum repul-
 tric. Verum secus habet. non enim ipsa hæc
 efficit, sed ex illis quæ efficit hæc proueniunt,
 idq; non semper. Quapropter non ex his, sed
 25 illis quæ ab ea semper accipiuntur, constituta
 est. Hæc autem sunt adiectio & ablatio. Proin
 id Hippocrati medicina est, cuius vsũ ad præ-
 sentem hominum salutem tuẽdam, amissam

C. GAL. PERG.

recuperandam requirimus. Ex illis ergo quæ
semper facit constituitur, non ex his quæ il-
linc fieri solēt. Aliud nanq; ars, aliud eius finis
est. Hunc autem non affectat illa, sed quod cir-
ca ipsam est scilicet, neq; id perpetuo. Quò fit
vt quousq; hoc non assequitur, non finis eius,
sed scopus dicatur. Cum autem contigerit, fi-
nis. Ita gubernatoria & sagittandi ars non à
fine, quem non semper contingunt, sed qui-
bus constitutæ sunt, & per quæ, vt finem asse- 10
quantur, functiones obeant, definitionem for-
tiuntur. Quæ omnibus ferè post Hippocra-
tem proba esse videtur. Herophilo medicina
est scientia salubrium, insalubrium, & neu-
trorum. Trium enim horum in illa cognitio 15
est, Salubrium quæ corporis constitutionem
ita gubernât, vt ex eis pulchrè inuicem apta-
tis, sanitas concilietur, Insalubrium quæ sa-
lubrem statum dissoluunt, Neutrorum om-
nia sunt auxilia, quæ ægris adferuntur. Hæc 20
enim priusquam à medico excepta sint, neu-
tra, hoc est nec salubria, nec insalubria sunt.

QVOT PARTES MEDICINÆ.



Primariæ medicinæ partes sunt,
rerū naturæ contemplatio; Caus- 25
sarum morbos continentium no-
titia; Sanitatis tuendę ratio; Signo-
rum obseruatio, & medendi mo-

INTROD. SEV MEDICVS. 7

dus. Græci sic vocant: φυσιολογικὸν, αἰτιολογι-
 κὸν, ὑγιεινὸν, σημειωτικὸν, & θεραπευτικὸν. Athenæ⁹
 pro signis materiam constituit, quæ in medi-
 camētaria parte versatur. Sine illa nanq; me-
 5 deri quis possit? Indiciorum obseruatio curan-
 di rationi necessaria, non tamen ipsa est cura-
 tio. Materiæ enim beneficio curatio absolui-
 tur: atque altera alterius poscit opem. Signa
 vel citra curationem ad cognoscendum quæ
 10 mederi queas, & quæ minus, necessaria sunt.
 Adhæc faciūt ne inscius ijs qui medicinæ nul-
 lum locum reliquerunt, manum admolitus
 erroris notam incurras. Iam vero quinq; ha-
 rum partium medicinæ, cuiusq; diuisio quæ-
 15 dam angustior est. φυσιολογικὸν itaque pars di-
 citur, in qua de hominis natura differimus.
 Constat autem, si diuidas, elementorum no-
 titia, quibus homo componitur: tum gene-
 rationis fœtus, & formationis: Præterea inte-
 20 riorum & exteriorum corporis partium spe-
 culatione, cum mortuorum cadauera incidi-
 mus, ossiūmq; rationes perscrutamur. αἰτιολο-
 γικὸν, in qua ea quæ præter naturam sunt in-
 quirimus: morborū causas, accidentium con-
 25 cursus, affectuū status diligenter indagamus.
 His enim incognitis, nemo rectè nouerit quo
 modo morbos curare conueniat, qui vnde hi
 sint ignoret. ὑγιεινὸν sanitatē tuetur, tum præ-

tauet quò minus corpora in morbos incidāt.
 Vbi inciderint, ad sanitatem reducat. *σημειωτικὸν*
κὸν præteritorum cognitionē, præsentium in-
 spectionem, & futurorū præfagia continet. *Θε-*
ραπειτικὸν, id est curādi facultas in tres partes **5**
 diducta est: vt vna esset quæ victu, altera quæ
 medicamentis, tertia quæ manu mederetur.

AN MEDICINÆ DIVISIO IN
 QVINQVE PARTES DIDUCTA
 NECESSARIA SIT. **10**

PRoinde rerū naturæ cognitio ne-
 cessaria est hoc potissimū nomi-
 ne, q̃ nisi naturalibus antea cogni-
 tis, ea quæ à naturali habitu rece-
 dunt, cognoscere queas nūquam: **15**
 nam præter illorum naturam morbi cōsistūt.
 Causarum vero morbos continentium noti-
 tia non minus desideratur, vt affectuum origi-
 nes, quibus resistere conuenit, intelligamus:
 tum ipsos affectus, eorūque status à veteri- **20**
 bus appellatos cognoscamus. Vtilis fanè sym-
 ptomatum affectibus incumbentium cogni-
 tio est: nam ab horum concursu, quem Empi-
 rici *ἰατρικὸν* græcè vocant, corporis vitia spe-
 ciem nanciscuntur. Quauquam iidem Empi- **25**
 rici in syndromis quæ cuiq̃ accidenti conue-
 niant, obseruarūt. Methodicis curationem af-
 fectus indicant: quemadmodum rationalibus

INTROD. SEV MEDICVS. 8

causſæ. Licet ipſi nihilo minus tum affectus,
 tum cōcurſus inquirent. Totum autem cauſæ
 ſis attribuunt, quarum nōnullæ προκαταρκτι-
 καὶ, aliax προηρόμεναι, quædam συνεκτικαὶ, quæ-
 5 dam συνέργου, reliquæ συναίτιαι, Græcis nomi-
 nantur. προκαταρκτικαὶ, igitur ſunt euidentēs
 Latinis dictæ, quæ dum aduerſam valetudi-
 nem crearunt, ſeparantur: vt frigus, laſſitudo,
 calor, cruditas. προηρόμεναι, id eſt præcedētes,
 10 ſiue internæ, quæ ab euidentibus vel præpa-
 rantur, vel coadiuuantur: vt ſanguinis abun-
 dantia nutrimenti copię ſoboles eſt. Præcedit
 autem Eraſiſtrati coincidentiam, quam Græ-
 ci πρὲς μῆωσις nominant, quæ omnium mor-
 15 borum cauſa eſt coniuncta. At citra præce-
 dentem nulla eſt. συνεκτικαὶ, id eſt coniunctæ
 ſiue continentes, quæ permanent poſtquam
 morbum excitarunt, hoc eſt cum præſentes
 ſunt, & affectus eorum aſſunt: cum increſcūt,
 20 affectus augentur: cum decreſcunt, minuun-
 tur: & cum deſinunt, finiuntur. συνέργου, id eſt
 coadiutrices quæ ſua virtute morbum effice-
 re non poſſunt, ſed alterius auxilio: vt libido
 articulare morbum promouet: & remiga-
 25 tio ſanguinis eruptionem fouet. συναίτιαι, hoc
 eſt cohærentes, ac quaſi dicas concauſſæ, quæ
 etſi affectum ſua vi poſſunt generare, alteri ta-
 men cohærēt: vt lapis in veſica, & inflamma-

tio. Porrò salubris illa pars non solum vt pars
 medicinæ, sed tanquã potior ei quæ medetur,
 præponitur. Multo enim præstat ne quidem
 morbum prorsus admittere, quã morbo libera- 5
 re: quemadmodũ gubernatori longè præsta-
 bilius est ante tempestatis exortum iter absol-
 uere, quã fluctuatum periclitatũque euadere.
 Atqui differunt rursus in ea parte, quã ὑγιὲς
 Græce appellauimus, sanitatem tueri, & mor-
 bos longius prospicere. Etenim cõsuetu victus 10
 ratione primum administratur: alterũ medi-
 cinae auxilijs ad præuidendam futurã ægritudi-
 nem, & præsentẽ discutiendam indiget: siqui-
 dem quæ iam ortis affectibus medicatur, ea-
 dem quoq; prius quã oriatur, prohibet illos con- 15
 sistere. Similiter artis pars, quã iuniores me-
 dici ἀναληττικὴν, tanquam reſectricem appel-
 lant, differentiæ cum illis nonnihil habet. Qui
 enim reficitur & recreatur, nondum à natura-
 li habitu recessit, nec in eo est, sed iam priore 20
 morbo defunctus, ad sequũdam valetudinem
 reuertitur. Quamobrem aliam rationem sa-
 lubrem desiderat, nec medicamentariam (non
 enim ægrotat) nec eam qua sani vtuntur, vt
 qui nondum absoluta fruatur sanitate. Quò 25
 fit vt nec qualitate, nec numero pari cum sa-
 nis cibũ possit assumere. PRAESAGIEN-
 DI pars medicinæ, curationi morborum per

INTROD. SEV. MEDICVS. 9

victum summè est necessaria: nam præterita
 & præsentia ad morbi causam inueniendâ di-
 ligenter inspicimus. Insuper magna eius ne-
 cessitas est ad præfagiendum, mors, an salus
 5 expectanda sit. Pari modo medicina quæ ma-
 nu medetur, tum illa quæ medicamentis au-
 xiliatur, sine indiciorum obseruatione nō ab-
 soluitur: quippe præfagia eodem modo desi-
 derant, quibus scias quæ curationem non ad-
 10 mittunt, quæcūq; eam recipiunt quidem, sed ve-
 hementer aut offendunt ægrum si curentur,
 aut è medio tollunt. Iam vero medicina trifa-
 riam diuisa est: vna victu, altera medicamētis,
 tertia manu medetur. Prima auxiliorum, quæ
 15 digerendi, apponendi, & concoquēdi faculta-
 tem habent est administratio. Omnibus qui-
 dem ægrotis, sed præcipue febrientibus in vsu
 est. Secūda incisionibus, vstionibus, & ossium
 restauratione homines curat. Tertia tenuibus
 20 medicamentis interiores affectus & exterior-
 res sanat: interim eius quæ victu morbos cu-
 rat, interim illius quæ manu medetur mutuū
 requirit auxilium: quemadmodum hæ duæ
 medicamentis nonnunquam vtuntur. Itaque
 25 à rerum naturæ contemplatione, superioribus
 paulum intermissis, auspicabimur: quoniam
 nec in sanis sequūdam valetudinem tueri, nec
 in ægris morbi originem siue causam cogno-

c.j.

scere, nec signis quid deprehendere, nec cūra-
tionem admoliri rectè possis: ignorās quibus
homo elementis constet, & quomodo his im-
mutatis à natura quam obtinebāt prius, mor-
bi nascentur.

S

DE ELEMENTIS HVMANIS.



Constat homo ex primis mūdi qua-
tuor elementis, igne, aere, aqua, &
terra, naturalium cum Hippocra-
te cōsensu. Non q̄ ex his iplis, sed 10
pro portione eis respondentibus constituatur.
Atqui Hippocratis sentētia, dum dissoluitur,
in hæc prima reuertitur: & quodque in suam
ipsius naturam, homine vita defuncto, redire
necesse est: Siccum in siccum, frigidum in fri- 15
gidum, calidum in calidum, humidum in hu-
midum. Huiusmodi vniuersorū animantium
natura est, omnia similiter oriuntur & desi-
nunt. Conflatur enim ex his prædictis eorum
natura, & in eadem finit. Vnde singula origi- 20
nem nacta sunt, eò quoq̄ recedunt, quemad-
modum Homerus hisce verbis innuit: Vos a-
qua, vos tellus cunctos aliquando tenebit. Cæ-
terū hominem ex propinquis & humanæ na-
turæ vicinis quatuor humoribus, sanguine, pi 25
tuita, bile tum flaua, tum atra constitutum es-
se phisici pronūciant: quoniam in prima sui
formatione ex genitura & sanguine mēstruo

foetus auspiciū cæpit. In his autem quatuor
 humores erant. Qui ex tribus, ijsq̃ composi-
 tis hominem prodijſſe cenſent, hæc proponūt
 initia: humida, ſicca, & ſpiritus: quæ Hippocra-
 5 tes Græcè συνέχοντα, συνεχόμενα & ὀρμῶντα ap-
 pellat. Ea ferè Latinis ſonant continentia, cō-
 tenta, & quibus animi impetus debetur. Con-
 tinentia igitur ſunt ſolida omnia, vt oſſa, ner-
 ui, venæ, arteriæ: ex quibus & muſculi, & car-
 10 nes, totaq̃ corporis moles cōflata eſt. Adhæc
 interiorum exteriorūq̃ concretionēs. Con-
 tenta vero humida ſunt, quæ in vaſis per tota
 corpora diſperſa feruntur. Atq̃ hæc quatuor
 prædictos humores vocat Hippocrates. Ani-
 15 mi appetitionem ſpiritus ducunt: quos vete-
 res tres, animale, naturalem & vitalem, nu-
 merant. Stoici quartum quendam inuehunt
 ἐκτικόν, quē habitum interpretantur. Eraſi-
 ſtratus vaſa triplicia, neruos, venas, arterias,
 20 omiſſis ſpiritibus & humidis, tanquam initia
 & totius corporis elementa conſtituit. Nam
 duplici materia regi animal affirmat, ſanguis
 ne tanquam alimento, ſpiritu tanquam na-
 turæ functionibus obeundis coadiutore. Non
 25 autem ea vt principia intelligit. Multæ ſanè
 aliæ partium ſpecies non ex tribus illis com-
 poſitæ inueniūtur: vt cerebrum, medulla, atq̃
 oſſa omnia. Cerebrū igitur vel medullam nu-

trimenti parenchyma, quasi adfusionem ex-
 ponas, audet appellare: sicut adipem iocineris,
 lienis, & pulmonis consistentiam. At ossa ne-
 que nutrimenti parenchymata, neq; ex prædi-
 ctis vasis triplicib⁹ composita esse dicere pos- 5
 sit. Asclepiadi hominis elemēta sunt corpus-
 cula manantia, & inuisibilia foramina. Secun-
 dum Athenæi sentētiā non quatuor illa pri-
 ma corpora, ignis, aer, aqua, terra, sed eorum
 qualitates calidum, frigidum, siccum, & hu- 10
 midum. Ex quibus duo caussarū efficientium
 munere fungūtur, puta calidum & frigidum:
 duo materialiū, siccum & humidum. Quin-
 tum vero ex Stoicorū opinione introducitur
 spiritus cuncta penetrans, à quo omnia conti- 15
 nentur & gubernantur. Hippocrates cum tri-
 fariam hominis elementa diuisisset, in conti-
 nentia, cōtenta, & ea quæ animi impetum re-
 gunt: quibus omnia post eum asserta elemen-
 ta comprehendit: adhæc rerum naturæ con- 20
 templationem, & morbos generantium noti-
 tiā, haud scio quomodo successores ei⁹ vnam
 illam reuera diuinam Aesculapij medicinam
 in tres partes diduxerunt: genuinas ab ea se-
 parauerūt. Alij enim tum sanitatis, tum mor- 25
 borum causam humidis attribuere, vt Praxa-
 goras & Herophilus. Alij duris corporibus,
 vnde initia & elementa sumpserimus: vt Era-

INTROD. SEV MEDICVS. II

sisstratus & Asclepiades. Athenæi vero & Archigenis imitatores spiritū tantum ea penetrante, tum naturalem habitum consistere ac gubernari, tum morbos vniuersos hoc prius offenso creati dixerūt. Vnde & pneumatici tāquam spiritu laborantes nuncupantur.

EXTERIORVM CORPORIS PARTIVM APPELLATIONES.

10 **H** Vmani corporis partes, earūmq; nomina primus Aristoteles docere simul & scribere instituit. Temporis autē processu medicis quoq; 15
ipsis posterioribus de ijsdem tractare operæ precium visum est: non vt dedita opera quaque particulam ostenderēt, sed ex appellatione sufficientē earū notitiam haberent. Quorum in numero maximè fuerunt Erasistrati sectatores, Apollonius Memphites, & hoc prior Xenophon. Diuidunt igitur totum corpus 20
Aegyptij quadrifariam: in caput, manus, thoracē, & crura. Alij has quatuor partes in plures diducunt, nempe in alias totius, non vt illarum particulas. **CAPITIS** igitur tota latitudo pars ipsius corporis dicetur. Huius par 25
ticulæ sunt hæ: Anterior supercilia excedens, pilis vacua, inter vtrancq; aurem sita, **FRONS** nominata. Hac superior capillis intecta, **SINCIPIVT**. Partem inter vtrunlibet oculum,

c.iiij.

& aurē positam TEMPORA appellamus.
Media iter occiput & sinciput est VERTEX.
Vnde velut à cētro circulus pilorum prouen-
tus existit. Post verticem à posteriore capitis
parte adusq; tendines OCCIPVT descēdit. 5
A priore sub tota fronte, auribus, oculis, naso,
& ore ad mentum vsq; circumscrip̃ta à super-
cilijs incipiens FACIES dicitur. Vbi enim
frons à superioribus descendens desinit, SV-
PERCILIA, ceu termini eius eminentes, & 10
pilis confiti eam excipiūt. In quibus autem fi-
nibus frons tempora contingit, ibi AVRES
sitæ sunt: quarū pars exterior AVRICULA
dicitur: parte constat superiore pinna, inferio-
re fibra. At interior pars forma anfractui co- 15
cleæ similis desinit in os, quod auriculam pla-
nè imitatur. In huius medio rotundum fora-
men, seu meatus auditori⁹ ad CEREBRVM
pertendit. OCVLI supercilijs subiacent, quo-
rum partes superius inferiūsq; interiores tu- 20
nicas contegentes PALPEBRAE appellan-
tur. Committuntur inuicem crebro & extre-
mo tactu ad visus recreationē: & ne quid ex-
trinsecus de insperato oculis incidat. Maximè
verò, quemadmodum in somnis, visoriæ vir- 25
tutis auertēdæ gratia, quò melius homo con-
quiescat. Extremum ambitum genæ superio-
ris antiqui CILIVM vocauere. Vtriusq; pi-

INTROD. SEV MEDICVS. 12

los Græci βλεφάριδες ab origine ipsorum nominant. Facti autem in hoc sunt, vt visorium spiritum, vel, vt quidam aiunt, radios ab exteriori parte effusos perspiciendi gratia dirigāt.

5 His itaq; elapsis, vel retortis, nequaquam animans similiter vel rectum, vel longum videre potest. Interiores oculorum termini superioris, inferiorisq; palpebræ communes anguli sunt: alter iuxta nasum, iuxta tempora alter: hic paruus, ille magnus. Quod in horum medio cōsistit OCULI CANDIDVM. Huius rursus medium iris circulus coloribus varius occupat. Vnde quoq; nomen à cælesti illa iride nomen accepit. Humor oculi interior

15 quo videmus PVPILLA est. Quod eā ambit NIGRVM dicitur. NASVS oculos interiacet: eius partes vtrinq; sitæ NARES vocantur, quibus aerem reddunt animantia & accipiunt. Exteriores autem partes PINVLAE

20 siue ALAE nominantur. Quod autem nares discriminat, INTERSEPTVM vocamus. In vtraque nasi parte sub oculis quædam sita, propriè CONCAVA nūcupamus: vnde quidam nomen fortiuntur. In morbis enim hæc

25 attolluntur ob hominis cruditatem vel nauseam. His autē superiores inter nasum & aures MALAE, priscis etiam GENAE dicuntur: quæ bene coloratis & ingenuis pudore suffu-

c.iiij.

C. GAL. PERG.

sis rubent. Hinc MAXILLAE ad mentum
 vsq; descendūt, & partes ipsius extremæ quasi
 bicornes sunt. MENTVM id omne est, quod
 labro inferiori longa orbiculatim figura sub-
 iacet. Extrema pars malarum sub naribus $\mu\upsilon\sigma\alpha$ 5
 Græcis, Homero ὑπὸνῃ appellatur. Quod
 intra labra describitur, & ab eis constituitur &
 continetur, OS est: Videntur enim hæc quasi
 connata, post diducta os efficere: quare etiam
 veluti nuper diuisa apparēt. Caput CERVIX 10
 excipit: huius posteriores partes recti valen-
 tesque nerui, quos Græci τένοντες appellant,
 possidēt. Dein sub ceruice SCAPULAE pro-
 minent, quarum verticem ἀκρώμιον Græci no-
 minant. At à summa costa paulo interiori q̄ 15
 ea media est, CLAVICULAE excrescunt.
 Hinc HUMERVS vtrinq; incipit. Superius
 humeri caput verticulatis scapularum ossibus
 inseritur. Inferius brachio iunctum, CVBIT-
 VVS quoq; Latinis vocatur. Cuius exteriori 20
 rem partem Attici κορωνὸν & ὠλέκρانون nomi-
 nāt. Dein BRACHIUM cōstat RADIO &
 CVBITO, quo & homines metiūtur. Vbi hi
 coeunt, manūiq; iunguntur, VOLA est. Op-
 posita eius pars μετακάρπιον, nomen latinita- 25
 te necdum donatum. Inde recta quinq; ossa
 ad digitos tendentia PALMAM explent, à
 quibus ipsi DIGITIORIūtur: Græci κονδύλεις

INTROD. SEV MEDICVS. 13

appellant. Digitorum maximus **POLLEX** est: ἀντίχειρ Græcis quasi manus altera dictus. Post hunc **INDEX**. Dein **MEDIVS**. Hunc **MEDICINALIS** sequitur, à medicis nomē sortitus. Postremus **MINIMVS** dicitur, q̃ omnib⁹ & corpore & virtute sit inferior. Itaque à vola **MANVS** incipit: mox palma asurgit, cui⁹ pars opposita ὑποτένναρ Græco nomine vocatur, Latino carens. Verum vnde digiti procedunt, **PECTEN** manus est. Quod mediū manus est, κοῖλον Græcis dicitur. **THORAX** ea pars appellatur, quæ à collo ad pendenda vsq̃ protendit. In hoc sub osse pectorali & alis vtrinq̃ costæ sunt. In harum medio **PECTVS**. Huius rursus medium vsque ad cartilaginem, sub qua ventriculi os delitescit, σέρνον Græcis dicitur. Hinc **OMENTVM** oritur. Quæ sub ventriculi ore ad partem exteriorē apparent, **PRAECORDIA** nominamus: Græci ὑποχόνδρια. Sunt autem **MVSCVLI**, qui expansi membranæ prætenui veluti araneæ, quā πλετοναίον Græci nomināt, subiacent: Extrinsecus vero cutem contegūt. Aequiuoco autem vocabulo etiam interiora viscera vocamus præcordia: sed exteriora proprio. At vniuersa hæc omētum comprehendit. **ILIA** autem inter vtrunq̃ latus consistūt. Ventrīs medium occupat **VMBILICVS**.

LICVS. Inde ad pubem spacium Græcis ἱσθός
 vocatū est. Postea **PVBES** sequitur. Vbi tho=
 rax finem, masculorū **NATVRALIA** prin=
 cipium fortiūtur: tum fœminarum ad femo=
 ris vtriusq; processum, vt sub hoc occultētur. **S**
Maris COLES postremo thorace propēdet.
 Sūmitas eius **GLANS**: cutis quæ eam conte=
 git **PRAEPVTIVM** dicitur. Inferior pars
 in longitudinem vergens ἑσφὴ Græcis hæte=
 nus vocata est. Quæ vero adusq; sedem pro=
 ducitur, τὰ ὕρως. Subiacēt membro genitali ge=
 mini **TESTES**, foris & intrinsecus. Cōmu=
 nis deinde vtrique, omnib;que interioribus
 sinus est, qui iam conspicitur à nobis, ὀσχεον
 Græci, nostri scrotum vocant. Muliebris au=
 tem pudēdi (sic enim nominaui ipsum) sinus
 pilis decoratus, græcum nomen κτῆς obtinet. **10**
 At quæ sinum ambiunt, alæ vocantur. Inter
 has autem caruncula quæ bifariam excreuit,
 græcorum lingua νυμφήρ, nostra colliculum ap=
 pellare licet: quem q̄ multo promineat, Aegy=
 ptij in virginibus excidere consuerunt. Porro
 in ipsius naturalis collo musculus est, quo vri=
 nam cum lubet retinemus: **ANNVLVS** à fi=
 gura: Ab officio **FIBVLA** vocatus est. Cate=
 rū posteriores corporis partes, quæ collo sub=
 iacent, hunc situm & appellationem habent. **20**
DORSVM ponē pectus est, cuius vtrinque **25**

INTROD. SEV MEDICVS. 14

duo scapularum ossa, nostri SCOPTVLA
 operta, Græci ὠμοπλάτας nominant. Media
 ad amussim pars à capite ad nates vsq; SPI-
 NA dicitur. Huius partem quæ recto tramite
 5 lumbos diuidit, ἄκνησῆρ Homerus nominauit
 in hoc hemistichio κατ' ἄκνησῆρ μέσσε νῶτα. Spi-
 nam LVMBI quibus succingimur, excipiūt.
 OS SACRVM eius terminus est: in cuius vs-
 traque parte COXA E sunt: in his NATES:
 10 quoniam quæ his subijciuntur, maxima ossa
 sunt. Inde carnosæ ipsis partes submittuntur.
 Quorum GIBBAE partes, quod orbiculares
 sunt σφαιρώματα, ceu modo circulatorum factæ,
 Græcis nominantur. Inde corpus vnū in duos
 15 exit processus. Nam femora à coxis statim
 oriuntur. Vbi vero illa committuntur cruri-
 bus, nodūmque efficiunt GENVA nomina-
 mus. Eorum partes ambientes quæ deorsum
 spectāt POPLITES. Ipsum autem CRVS
 20 ab exteriori parte SVRA, priore TIBIA re-
 cte nominatur. Postremum cruris in vtrunq;
 latus excedens TALVS est: ab hoc PEDES
 propriè appellantur: quibus etiam mēsuram
 sibi aliam homines in altum tollentes inuene-
 25 runt. Pars posterior CALX: prior discreta in
 digitos quinq; est, Græci τάρσος vocant. In-
 terior autem quasi pedibus inuicem se aspi-
 ciētibus à talo versus magnum digitum pro-

cedens, nominis adhuc Latini indiga πεδιον
 Græcis appellatur. Sub hac P L A N T A est,
 qua solum cōtingimus. Cuius concavum La
 tinum etiam nunc nomen desiderat, Græcis
 κοιλον est. Quod post hoc ad digitos assurgit, s
 P E C T E N pedis nūcupatur. Plantæ palmis,
 digiti digitis, vngues vnguibus respōdēt. Non
 autē eadem sortiti nomina: quoniam nec eos
 dem præstant vsus: quanquam aut numero,
 aut situs ordine conueniunt. 10

I N T E R I O R V M A N A T O M E.

IXteriorū corporis partium enar= 15
 ratio præter vsū anatomes vo=
 cabulum vsurpat. Est enim ratio=
 nis singularum partium cum na=
 turali earum situ, ordine, & vsu,
 quem animanti exhibent, & propria appella=
 tione, de qua verba fecimus, explicatio. Inte=
 riorum vero propriè naturalis declaratio in=
 cisionis nomen meretur. Siquidem oculis eas 20
 indicatas esse, insectio non est, sed cuiusq; no=
 titiam ratione accepisse: & naturales actiones
 quomodo ipsas obeāt didicisse. Præterea quē
 inuicem contextum viscera, aliæq; corporis
 partes venarum beneficio obtineant. C E R E = 25
 B R V M itaque ex nullo eorum quæ prædixi=
 mus principe vase compositum esse videtur
 Erasistrato: eóq; nutrimenti quasi affusionem

ipsum vocat. Est autem corpus simplex, atq;
 ob id omniū quæ humano continentur cor=
 pore & summū, & princeps. Quapropter Pla=
 to & Hippocrates animi principatum in eo
 5 constituunt. Comprehenditur sanè membra=
 nis duabus. Vna prominenti, eiq; cōtinua χο=
 ρόειδος Græcis appellatur. Altera hanc supe=
 rans caluariae quibusdam partibus magis ad=
 hærescit. Sed hæc nervosior, illa venosior ex=
 10 istit. Ex superiore illius parte venæ nutrimen=
 tum à corde iuxta arteriarū basim acceptum
 in id deriuant. Ex inferiore nerui principium
 capiunt, & animi functiones vniuerso corpo=
 ri communicant. Nervorum autem species
 15 duæ sunt: Vna mutuos ossium connexus tue=
 tur: Altera sentiendi mouendiq; pro arbitrio
 facultatē corpori trāsmittit. Atq; hinc etiam
 musculorum proventus est. Oculorum mea=
 tus & ipsi ab ima cerebri parte proueniunt: &
 20 per eos visorius spiritus oculis impartitur. In=
 de vero nares etiam processus habēt, per quos
 & odoramur, & cerebrum expurgatur. Ad au=
 res processus non sunt. Verū à posteriore par=
 te tenuis membrana, quam Græci μίνιγχα vo=
 25 cant, perforata est: Adhæc quæ σκωλικοειδης di=
 citur ex eo loco processum habet: per quam
 similiter ipsæ repurgantur. In illius principio
 cerebri pars Græcis κωνοειδης appellata sedem

C. GAL. PER G.

habet. Iam vero illinc SPINALIS medulla
 incipit. Cæterum duos habet cerebrum ven-
 triculos. Quorundam opinione vnum, vbi a-
 nimi principatus desidet. At CALVARIÆ
 ossa superiore parte sub cute, membrana, quæ
 per futuras è meningibus prodijt, περικράνειον
 Græci nominant, conteguntur. Atq; hæc ori-
 go membranæ costas succingentis, ὑπεζωκότα
 nominant, & septi transuersi, & peritonæi, &
 deniq; illius ex toto quæ nervis cōstat. OCULVS
 ex Hippocratis sententia habet duas tu-
 nicas, quas Græci μνηγὰς, quòd ex illis pro-
 uenerint, appellat. Recentiores tres ponunt:
 nonnulli quatuor. Ex quibus superior à Græ-
 cis κερατοειδής vocatur. Ea qua parte alba est,
 satis crassa, pupillæ loco extenuatur. Perspicit
 vbi nigra, vel cæsia, vel flaua apparet. Huic in-
 ferior adiūcta est media parte, qua pupilla est:
 modico foramine, concaua, circà tenuis, aci-
 no vix similis, quæ χυμοειδής à Græcis nomi-
 natur. Tertia retis modo, sinum habens ἀμφι-
 βληστροειδής nuncupatur: nōnulli eam in sum-
 mo quartam tunicam excipere tradūt, quam
 ἀσθηλον ceu minus apparentem vocare consu-
 erunt. Est etenim membrana minima simul
 & tenuissima: sed prior & secunda firmæ cras-
 sæq; tunicæ sunt: tertia vero & quarta tenuissi-
 mæ. Quare Hippocrates priores solas cogno-

uit: oculus inquiring membranas duas habet.
 Porro triplices hæ tunicae humores continēt.
 Hunc ab aquae similitudine ὕδατοειδής Græci
 vocant. Illum ὑαλοειδής, quod vitro quiddam
 5 simile referat. Tertium χρυσάλλοειδής, à quo vi
 dendi facultas proficiscitur. Palpebrarum in
 teriores partes carnosæ: mediæ cartilaginosa:
 Exteriores cute teguntur. At quoniam carti
 lago media dura est, adeps mollissima tactu
 10 subiecta est: quæ frequenter exuperans, gut
 tas parit. LINGVA maximè carnosæ est, in
 quam duplex neruorum genus ab ima parte
 cerebri prodiens inseritur. Alij molles appel
 lati, gustandi sensum, Alij duri motum arbi
 15 trarium à principio suo deducunt. Ad huius
 radicem exigua in arteria sub faucibus ipsis est
 lingua, quæ cum spiramus attollitur: cum ci
 bum potionemque assumimus, arteriam clau
 dit, ne quid in eam delabatur. Cuius rei quoque
 20 causa tonsillæ numero quatuor creatæ sunt:
 duæ ad linguæ radicem, vtrunque conspicuæ:
 duæ penitus his minus prominēt. Nominan
 tur eedem etiam Græcis παρίσθμια, quoniam
 locus in quo sitæ sunt, maximè isthmo, cum
 25 per inflammationem intumuerūt, figura re
 spondent. Nam quum tribus rebus animan
 tium vita teneatur, cibo, potione, spiritu: ad
 hunc quidem percipiendum, nares, os, fauces,

aspera arteria, & pulmo partes sunt aptissime.
 Nares sanè & os respirationi seruiunt. Gurgi-
 lio ne frigidus in fauces aer cumulatim irrum-
 pat: Aspera arteria, vt eundem in pulmones
 deducat, quorum in pectore sedes est: per hos 5
 omnis fit respiratio: submittentes quidem se,
 vt spiritus emittatur: attollentes vero, vt ani-
 mam recipiāt. Quare vsu similitudinē quan-
 dam cum fabrorum officinis habere videtur.
 Figurā vero vngulæ bubulæ seruāt. Porro ex 10
 spiritu quicquid vtile, ac vitæ necessarium in
 pulmonibus elaboratū est, ad sinistrum cordis
 ventriculum defertur. Quicquid inutile est, il-
 lac qua inspirauimus efflatur. Nutrimenti va-
 sa ad excipiendum, & instrumenta ad elabo- 15
 rationem instituta hæc sunt: os, dētes, stoma-
 chus, vētricus, ieiunum, & tenuia intestina.
 Os quidem & dentes cibum extenuant mol-
 liuntq̃. Stomachus appetit & diglutit: appen-
 sus asperæ arteriæ ad septum vsq̃ trāsuersum 20
 porrigitur. Ventriculus cibi receptaculum pri-
 mam molitur cōcoctionem: incipit à media
 cartilagine, vbi ventris os situm dicitur. Sub-
 fidet leuiter iocineri, latitudine Græcorum li-
 teram σ referens: & paulum in dexterio- 25
 rem partem cōuersus, in summum intestinum co-
 artatur. Hanc iuncturam πυλωρ Græci vo-
 cant: quoniam portæ modo, ne nutrimentum

ex eo delabatur,prohibet. Ab eo ieiunum in-
 testinum incipit,in sinus vehementer impli-
 citum:cui tale est vocabulum,quia nunquam
 quod accipit continet. Cōmittitur autem me-
 5 dio intestino,quod venæ in id ascendentes in-
 tertexunt. Inde tenuius intestinum est supe-
 riori ita cōnexum, vt pars eius esse videatur:
 quippe quod haud adeo substantia dissimile
 sit. Differt tamen q̃ nec vacuum sit,nec vaso
 10 rum copiam habeat:per quæ ad iocineris por-
 tas alimentum permanet. Deinde crassius al-
 terū transuersum est,alimento recipiendo ac-
 commodatum,cui cæco nomen dederunt ve-
 teres. Huic adhærescit aliud maius. Græci κῶ
 15 λον nominant: quod excremēta per digestio-
 nem segregata suscipit: Quibusdā eius mem-
 branis à iocinore & liene super vmbilicum ve-
 niētibus:atq; hinc dextrā recuruatū in imo
 20 dirigitur,qua excernit,totum amplectens ab-
 domen. Ideoque rectum intestinum in quod
 definit,ibi nominatur. Cum igitur duo mea-
 tus,siue itinera à lato oris spacio incipiant,al-
 terū iuxta priorem colli partem,asperam ar-
 teriam nominamus:alterū stomachum. Vn-
 25 de vero initium capit arteria,& vbi cooperi-
 tur,Latini fauces,φάρυγγα Græci vocant. Cæ-
 terum omnis meatus ex cartilaginibus annu-
 li modo vel circuli cōpositis constat,quò fir-
 d.j.

mus cōtinuæ animantis respirationi maneat,
 nec comprimatur: Quare etiam ostium eius
 patescit. Nam si in cibo assumēdo error com-
 mittatur, ne vel paululū respirare queas. Hu-
 ius rei gratia purum hunc spiritui transitum **S**
 natura dedit, ne impedimēti quid sentiat. Ver-
 bi gratia si quid vel cibi, vel potus in arteriam
 delabatur, strangulationes, tormina, & tusses
 grauissimæ excitantur: donec à spiritus impe-
 tu efferatur. Iam vero aspera arteria spiritum **10**
 pulmonem transmittit: definitq; in eiusdem ar-
 terias, quas asperas quoq; nominant. Stoma-
 chus interior ceruicis vertebris annexus, ad
 ventriculum fertur. Rursus quoniam arteria
 exterior à cibo infestatur, natura ad hoc mo- **15**
 dita est minorem linguam quæ eam operit: at
 que alimentum à lingua velut ventilabro pur-
 gatum, & gulæ initio superimpositum ad sto-
 machū pontis modo deiicit. Stomachus pro
 naturali functione appetendi facultatem ha- **20**
 bet: dum appetit quidē, se attollit: & quæ offe-
 runtur, deglutit: dum accepta superioris ven-
 triculi orificio contiguo per transuersum se-
 ptum tradit, submittitur. Per quē angustum
 etsi meatum in imam alimenta descendunt. **25**
 Ventriculi naturæ officium est, vt alimentum
 sibi cōmissum concoquat, quod à concoctio-
 ne primū ptissanæ cremori persimile est. Ve-

INTROD. SEV MEDICVS. 18

rum per arctiorē adhuc iuncturam imæ venæ
 triculi partis cū summo intestino, quam πυ-
 λωρὸν à Græcis appellari diximus, alimētum
 ieiuno instillat: quod cū tenue sit intestinum,
 5 in flexuosissimos orbes natura implicauit, ne
 ex facili videlicet diffecaretur, cōuellereturq̃.
 Medium intestinū anfractus & orbes eius am-
 plectitur, atq̃ ipsis insidet: quanquam id non
 solū hunc præstat vsum, sed etiam venæ duæ
 10 sub iocinere emergentes: quæ post in diuersas
 partes diducuntur, & meseræo adiunguntur:
 quò & ipsæ (sunt enim tenues) ruptionis peri-
 culum effugiant. Adsurgunt autem sic inter-
 textæ eidē simul basi huic innitentes, & sca-
 15 læ nauticæ instar alleuatae finiunt. Atque hoc
 pacto in singulis anfractib⁹ ad hirudinum si-
 militudinem cōpositis, aperto ore ieiuno in-
 hiantes, omnem in eo alimoniam in succum
 conuersam exugunt. Simul autem inter ex-
 20 ugēdum, protinus in sanguinē mutant. Non
 enim alibi vel pituitæ, vel sanguinis, vel alte-
 rius cuiusdam vas esse, natura indicat. Rursus
 igitur duæ ex multis venæ à medio intestino
 acceptum ad iocinoris portas digerunt. In io-
 25 cinere quum sanguinis naturam nutrimentū
 induit, recrementa singula pariter secernun-
 tur. Flaua bilis ad tunicam inferiori eius parti
 inhærētem defertur. Atra ad lienem. Iam ve-

d.ij.

C. GAL. PERG.

ro ab hepate versum in sanguinē alimentum
 in dextrum cordis ventriculum distribuitur.
 A corde per grādes venas in dextra sinistraq;
 circa guttur apparentes (σφαγιτίδες à Græcis
 nominātur) ad superiores corporis partes de- 5
 riuat. Per cauam autem venam in vniuersum
 corpus diffunditur. Ab hac rami duo sangui-
 ne iam à fero discreto ad renes perreptāt, qui
 lumbis sub imis coxis inhærent. Inde singu-
 læ venæ colore albæ ad vesicam feruntur, οὐρη- 10
 τήρας Græci vocant, quòd per eas inde descen-
 dentē vrinam in vesicam destillare concipiūt.
 Vesica autem vrinam per colem foras excernit.
 Testiculi vero fibrarum substantia prædi- 15
 ti, conceptacula & officinæ seminis sunt: q̃ per
 singulos nervos ab inguibus depēdentes, Græ-
 ci κρημασθήρας nomināt, ad eos destillat. Qui-
 bus cum alia vasa quoq; descendunt puta binę
 & venæ, & arteriæ nutrimētum conferentes.
 Hæ autem duabus tunicis conteguntur: qua- 20
 rum tenuiorem Græci ἐρυζοειδῆ: valentio-
 ρέστερον appellant. Communis deinde vtrique
 testiculo sinus est, ὀσχεον à Græcis, scrotum no-
 stris dicitur. Fœminis autem vulua scroti con-
 uersi similitudinē refert. Venæ in partem eius 25
 interiorem plurimū aperiuntur, per quas san-
 guis excernitur, qui grauidis retinetur: ceditq;
 in alimentum foetui, & formationem. Nam

à venis quæ locum infanti datum implicant,
binæ aliæ prodeunt venæ: ab arterijs binæ ar-
teriæ: & à nervis vnus nervus mutuo in vnū
congressu meatum quendam ab anatomicis
5 Græcis *ὀυραχορ* appellatum absoluunt: qui in-
fantis vmbilico inseritur: ex quocq; suspensus
infans fouetur. Ab vmbilico autem venæ ad
iocineris portas sanguinem in foetibus trans-
mittunt. Arteriæ iuxta vesicam sitæ, crassiori
10 arteriæ: nervus hic spinæ insertatur.

DE EA ANATOMES PARTE

QVAE AD OSSA PERTINET.



15 **S**isium duplex cōpositio: vna ad
motum & ad omnē corporis a-
ctionem accōmodata, nomen ar-
ticuli habet: altera ad stabilitatē,
συνάρθρωσις à Græcis dicitur. Hu-
ius autem tres sunt species: Sutura, commissu-
ra seu iunctura, & conglutinatio. Sutura igitur
20 tur capitis ossa constant quinq; potissimum.
Prima per sinciput *σεφανιαία* Græcis dicitur.
Altera à vertice per medium caput ad frōtem
procedit, *ὀβολαία* vocatur. Tertia occipitium
à summo capite deducit, ad aures per verticē
25 tendens *λαβροειδής* ei nomen est. Duæ super
aures tempora à superiore capitis parte discer-
nunt, quas *κροταφίαι* nomināt. OSSA CAL-
VARIÆ septē numerantur. Sincipitis vnū.
d. iij.

C. G A L. P E R G.

Verticis duo. Temporum item duo. Occipitiū
vnum. Septimū palato iūgitur. Cerebrū duos
à posteriore parte processus vtrique obtinet,
κορῶνας Græci appellant: qui primæ vertebræ
insinuantur: in qua velut axe sequentis caput
in latera mouetur, annuit, renuitq̃. Deinde of
fei quidam processus paululum inuicem dissi
dentes, per quos vtrinque recti, valentesq̃ ner
ui, deorsum feruntur. Pōst alia duo ossa super
foramina, per quæ facultas audiendi est, emer
gunt, iugalia nominari possunt ab eadem si
militudine, à qua id Græci ζυγωδῆ appellat.
Sub his rursus alia duo petræ modo & crassa,
& inæqualia prominēt, λιθοδῆ vocant. Priore
capitis parte processus sunt telo similes: hinc
quoq̃ βελανοειδῆς à Græcis dicuntur. Facti au
tem sunt ad faucium diuisionem. Vbi sum
mæ eorum partes cartilagine committuntur,
os ὕοειδῆς appellatur. Quæ vero has adhuc ex
cedunt, nomen tum apud Græcos, tum Latī
nos desiderāt. In priore parte à superiorū den
tium gingiuis per mediū palatum vnà proce
dens os, πολυμόρφον nominant. Porrò mala
rum ossa cōnexu mutuo cōstant. Facies item
eiusmodi cohærentias nouem habet. Prima
sub interioribus oculi vtriusq̃ angulis deor
sum spectat. Duæ à latere narium vtroq̃. Alia
medias nares recta interfecat. Malæ quoque

singulas transuersas habēt. Duæ rursus transuersæ palatum secant: vnâq; per mediũ idem palatum procedit. Communes autem faciei & capiti connexus, qui à tempore incipiens, 5 per medios oculos, narésque transuersus peruenit ad alterum tempus. Iam quidem faciei duodecim ossa sunt: Narium duo. Oculorum quoq; totidem. Palati quatuor. Malarum singula, ad alarum similitudinem structa. Maxilla quibusdam duo in mento connata, nonnullis vnum habet. Cæterũ dentes conglutinantur, nempè maxillæ, & superiori ossi malarũ. Sunt autẽ numero triginta duo. Ex his quaterni primi (quia secant) τομεις à Græcis nominantur: Hi deinde quatuor caninis dentibus ex omni parte cinguntur. Ultra quos maxillares seu molares viginti sunt. Reliquorum ossium clauis in altiore scapularum parte coeunt deligantur. In pectore articulus & commissura simul mixtæ videntur. Et Romanæ 20 literæ S, eiúsque simplicis figuram ostendunt. Dein costæ duodecim vtroq; latere ad imum pectus perueniunt. Septem ex eis spinæ vertebris, cumq; osse pectorali coeunt. Reliquæ 25 quinque à posteriore parte spinæ inferuntur. Inde patefcūt, & in exteriorẽ partem recuruatæ paulatim in cartilaginẽ degenerant. Vertebrae vero quatuor & viginti sunt. Septem in d. iij.

C. GAL. PERG.

ceruice. Duodecim ad costas. Reliquæ proxima costis ad lumbos. Quamquam os sacrum ex vertebra inuicem coeuntibus constare videatur. Quin & pectus similiter ex septē ossibus vnā commissis ensis figura structum esse s apparet. At humerus uterq; verticulatis scapularum ossibus inseritur. Scapulæ vero musculis posteriore parte costas subeuntibus incumbunt. Cubitus & radius, quem Græci κερκιδρα appellat, commissuræ quidem modo se se contingunt: Articuli vero, brachij tuberculum excipiunt. Tribus enim vertebra humerus in cubitum structura literę σ simili inseritur. Quarta iam vertebra radius veluti circa axem voluitur. Primæ palmę partis, quam volam nominant, tria ossa mutuo connexu deligata sunt: ad cubitum tamen & radium articulū aptè faciunt. Ex altera parte recta quinque ossa videre licet: articulum cum volæ ossibus, quibus connata sunt, explent. Inde digiti 20 orti ex ternis ossium nodis constant, & in singulis articulum expediunt. Femoris os vnum est: cuius caput leniter reflexum in coxæ sinus cōijcitur. Quam commissuram neruus, qui è medio sinu prodit, & in femoris caput 25 inseritur, cōtinet. Coxarum ossa singula à posteriore parte cū ossē sacro, priore inter se connexum habēt. Vbi pubis ossa vel pectinis no-

INTROD. SEV MEDICVS. 21

minatur. Ipsum autē crus est ex ossibus duobus: alterū ab exteriorē parte positum, Suram nostri, *περόνη* Græci appellant. Alterū à priorē, cui tibia nomē est, solum cum femoris inferiorē capite committitur. Quatuor autem in superficie figuras repræsentat, in quas femoris duas vertebra excipit. Quib⁹ à priorē parte paruum os, obliquum, sublatum, scuti brevis instar, cōmissuram earum in summo continens incumbit, patellam Latini vocant. Suræ autem superior extremitas interiori tibiæ parti connectitur. Inferior ad talos cum tibia ligamento nerueo, cartilaginosoq; deligatur. Intus autem in se ossa conuinciēs, calcaneum ostendit: quod in pedis longitudinem situm, ad suram assurgit, fixumq; ibi firmiter est. Cæterum tibiæ ossibus, tum ei quod *σκαφοειδῆ* vocant, talus in articulo cōmittitur. Rursus scaphoides, vbi cum talo coit vasculorum modo sinuatū est. E regione gibbū, calles trās habet, quib⁹ singula ossa *χαλκοειδῆ* inseruntur. Porro, quod cubi figurā repræsentat, extrinsecus situm est. Coniungitur autem carnosæ parti & calci. Processum ex inferiori ad priorē partem occupat, quem primæ pedum regionis os retinendi ipsius gratia subiit. Cætera ossa pedis, ad eorū quæ in manu sunt, similitudinem instructa sunt. Cōtrahunt autem horum iun-

C. GAL. PERG.

Eturas membranosa quēdem ligamēta. Talos
& calcem valida admodū: Et quædam ex ijs
rotunda simul & neruea, cartilaginosaq̃.

DE HVMORIBVS.



Humores corporis ex prima gene- 5
ratione quatuor, commixti inui-
cem & contemperati sunt. Exupe-
rat autem alius in alio magis lo-
cos: sanguis in corde, pituita in capite: Flaua bi-
lis in iocinere, atra in liene. Cæterum triplex 10
spiritus innati species: alius naturalis: alius a-
nimalis: tertius vitalis. Non desunt tamē qui
quartum quoq̃ asseuerāt hec̃ticon, solida con-
tinentem. Naturalis animantia & stirpes nu-
trit. Animalis sentiendi, mouendiq̃ facultatē 15
animatis exhibet. Nam his trib⁹ animalium
natura constat. Quare animalis in cerebro se-
dē habet. Naturalis in iocinore, vitalis in cor-
de. Hec̃ticus in toto corpore versatur. Natu-
ræ actiones sunt, ab origine imprægnatio, con- 20
formatiōq̃: in editis appetitus: cibi confectio,
concoctio, digestio, in sanguinem alteratio,
excretio, nutritio, & auctio. Excernuntur au-
tem in corpore stercus, pituita, vtraque bilis,
vrina, sudores, mucci, saliuā, & lac. Animæ ve 25
ro facultates, sensus & voluntas. Sensus quidē
sunt quinque, quibus animantia per corporis
instrumenta funguntur: visus, auditus, gusta-

tus, odoratus, & tactus. Instituit autem anima quædam sine corpore, vt cū ratiocinatur, vel irascitur. Cum corpore, vbi id ad quorundam receptionem, vel excretionem, vel ad loca mouet. Respiratio cōposita quædam actio esse videtur: partim ex arbitrio, partim sponte & naturaliter, vt in somnis, contingens. Sanus igitur homo est, primis, vnde constat, elementis: & secundis, vnde formam acceperit, 10 quatuor humoribus, mediocriter inuicē con- temperatis: Solidis autem partib⁹ nec diuisis, nec conglutinis, nec è loco suo motis: Spiritibus nec intensis nimium, vt in phreniticis: nec dissolutis, vt in lethargicis: vel in ijs, qui 15 stomacho laborant. His enim hecticus spiritus resolutus esse videtur. Sanus autem homo conseruandus est consuetis exercitijs, & cibis domi natis: copia eorū obseruanda est, ex qua cruditates oriūtur: quæ morbos pariunt. Præ- 20 cauendi morbi sunt, vel qui iam imminet, vel futuri sunt. Si ex plenitudine proueniant, inedia, vel purgatione, vel venæ incisione curandi sunt. Si ex labore & indigentia, recreare corpus & nutrire cōuenit. Verū vniuersi mor- 25 bi, ex Hippocratis sententia, partim extrinsecus ex aere nos ambiente: partim intrinsecus ex esu, potionēq; proficiscuntur: à quibus humorum aliquis vel increfcit, vel imminuitur,

vel qualitatem commutat. Ab his etiam spi-
 ritus insiti nunc intenduntur nimis: nūc plus
 æquo relaxantur. Solida vero corpora foris &
 intrinsecus pluribus morborum periculis op-
 portuna sunt. Erasistratus quidem & Asclepia
 des in vniuersum vnam cuiq; morbo causam
 tribuunt. Hic sanguinis in arterias coinciden-
 tiam: ille corporeæ molis extensionem, rari-
 tatēmq;. **P L E N I T V D I N I S** notæ sunt va-
 sorū intensio, faciei rubor, totius corporis tu-
 mor, & pulsuum magnitudo cum robore. In-
 digētix signa: collapsus corporis, gracilitas in
 facie, & exiguus pulsus cū imbecillitate. Itaq;
 febrem veteres per se affectū arbitrantur. Era-
 sistratus, & recentiorum nonnulli accessoriū.
F E B R I S igitur est natiui caloris in vehemē-
 tiorem conuersio. Nam intrò reclusus perspi-
 ratum non habet. Indicia febricitantium col-
 ligimus ex calore intenso & intolerabili, tum
 in accessione statim ex obscuro, inæquali, &
 crebro pulsuum motu: In statu, ex vehemen-
 tissimo motu, & veloci admodum. Iuniores
 calorem naturali magis ardentē, mordacem,
 acrem, & constantem, cum pulsuum frequen-
 tia, & duritie, ex alto venientem, febrem esse
 definiunt. Sunt autem duæ eius species om-
 nium sententia: continua, & deficiens. Conti-
 nua est, quæ non in decessionem prius, quàm

morbus ex toto solutus sit, venit. Deficientis
 rursum sex species inuenimus apud veteres:
 quotidianā, tertianā, quartanā, quintanā, se-
 ptimanā, & eam quæ à nono die nomē habet.

- 5 Quotidiana est quæ die noctēq; accessionē &
 decessionē implet. Tertianā vnum diem præ-
 stat integrū, tertio redit. Quartana duos dies
 intermittit: deinde reuertitur. Quintana trās.
 Septimana quinque. Quæ à nono die vocata
 10 est Græcis ἐννατηρία, septem. Nam quæ ἐμμε-
 τρία nominatur, modo inter continuas, mo-
 do inter deficientes ponitur. Iam vero reliquo-
 rum morborum duo genera sunt: vel cum fe-
 15 bribus, vel sine febribus. Quidam enim acu-
 ti: quidam longi sunt. Acuti quidem hi: Phre-
 nitis, ardor vehemens, Synanche, Lateris do-
 lor, Pulmonis vitium, Stomachi affectus, Re-
 gius morbus, Cholera, Voluulus, Coli dolor,
 Apoplexia, Tetanus, Opisthotonus, Empro-
 20 sthotonus. Acuti igitur à sanguine ferè & fla-
 ua bile, in nōnullis corporis partibus quæ ma-
 lè habent, superfluis, & in deterius versis con-
 stituuntur. Longi à pituita & atra bile, simili-
 ter vel naturalem habitum superantibus insi-
 25 gniter, vel in grauissimam qualitatem immu-
 tatis. Qui iam ex copia laborant, victus ratio-
 ne, vel inedia, vel purgatione, vel venæ incisio-
 ne curandi sunt. Qui ex abstinentia in mor-

C. GAL. PER G.

bum incidere, alimentis restituere conuenit.
 Quib⁹ cruditas & humorū acrimonia morbi
 causam fecerūt, ijs fomētis & cataplasmatibus
 concoctio paranda est. Acrida cōmiscere oportet:
 & cibis boni succi, atq; humectantibus uti. 5
 Cæterum quatuor in toto morbo, particulari-
 busque accessionibus tempora auxilijs adfe-
 rendis dicata sunt: Initium, incrementum si-
 ue accessio, vigor, & inclinatio. Principio to-
 tius morbi venæ incisio ad tertium quēque 10
 diem conuenit: inde in totū abstinere triduo.
 Venæ sectionem in initio recentiores ad tri-
 duū vsq; statuūt. Veteres etiam post tertium
 diem præcipiūt, si vires suppetant, & morbus
 postulet. Nutrimēti tēpus a triduo iuniores, 15
 antiqui non omnib⁹, sed ijs qui copia laborāt,
 tum iuuenibus, tum senioribus instituunt. Pu-
 eros statim morbo inuadente nutriunt. Præ-
 terea illos quibus huiusmodi consuetudo vel
 loci, vel aeris circūflui ratione est. Ab alimen- 20
 to post triduum primum fomenta capitis &
 præcordiorum ex vsu sunt. Sequētibus diebus
 cataplasmata & clysteres. Fomenta igitur in
 præcordijs calida semper assumere oportet &
 simplicia: cuminum, vel xylanethum: Ad ca- 25
 put calefaciētia quidem in lethargo, & in om-
 ni graui sopore: Refrigerantia in phrenitide,
 & quauis acuta febre cōueniunt. Cataplasma-

ta quædam solo melle & oleo conficiuntur: vocanturq; μαλακτικὰ, quasi interpreteris emollientia. Quædam ex aqua cui oleum sit adiectum, fiunt, quæ ὤμηρ λύσις Græci nominant.

5 Alia hic insperguntur, veluti pollen, lini semen, & telis. CLYSTERES hydræ, læo, melle, sale, & nitro citius præparantur. Tēpus eorum ante nutritionē est, dum accessiones remittunt & inclinant. In continuis rectus cly-

10 ster locum habet. PHRENITIS est mentis alienatio. Notæ sunt: insania vehemens, temeraria manuum gesticulatio, floccorum & festucarū collectio, & febris acuta. Causam habet vt plurimum bilem. Constituitur in cere-

15 bro, vel eius membranis quas μίνυγγας appellant, vel (vt quidam aiunt) in septo transverso. Curatio hæc conuenit. Initio, si præscius fueris, venæ incisio, cucurbitulæ, ademptio per clysterem & abstinentiam. Vigente morbo, fo-

20 menta soporifera, medicamenta liquida quibus somnus accersitur, & humectantes cibi conducunt. ARDENS FEBRIS, quam Græci καυσωδὴ nomināt, ab Hippocrate quidem inter acutos, vt quartana inter longos morbos

25 refertur. A recentioribus non item. Oritur ex bile iuxta iocineris venas non nimis siccas. In curatione primum sanguinis missio: in statu frigida, tum aliorum quæ refrigerandi vim

C. GAL. PER G.

obtinēt, potio confert: vel epithema, cuius-
 modi ex feruenti hydralæo præparatur. A N-
 G I N A est circa ceruicem inflammatio. Eius
 speciem vnā Græci κυνάγχην appellāt, cum
 lingua intus & fauces cum rubore intume- 5
 scunt. Subito hominem strangulat. Alteram
 συνάγχην. Hæc in exteriorem partem incum-
 bit, eoque minus strangulat, minúsque peri-
 culosa est. Vterq; affectus vel à bile, vel pitui-
 ta falsa nascitur. Sed febre acuta modo acce- 10
 dēte, modo nulla. Remedium & commune,
 & præsentaneum est sanguis statim in princi-
 pio missus: Deinde medicamenta pituitā edu-
 centia, & cerata foris imposita. Asclepiades vl-
 timum auxilium posuit, de quibus metus est, 15
 ne strangulētur, superiorem gutturis partem
 incidere. P L E V R I T I S laterum ab interiore
 parte inflammatio est. Huic febris acuta, do-
 lor vehemens, & tussis accedit. A bile potissi-
 mum constituitur. Præsidio est matura venæ 20
 incisio: Deinde cataplasmata & sicca fomēta,
 nēpè milij & salis: Postremo medicamēta in-
 trinsecus purgātia, quæ πλευρητικά nomināt.
 Obseruanda vero in his sunt vētris profluuia.
 P V L M O N I S vitium (Græci πνευμονία) 25
 vocant, nonnullis authoribus inflāmatio gra-
 uis est, idēq; grauitate ostenditur. Quibusdam
 pulmo inflammationem pati non posse vide-

tur: sed vicina eius loca. Habet autem hic morbus febrem acutam comitem. Eadem ipsius causa, quæ lateris dolorem concitat. Alijs tamen pituita. Remedium ferè huic cum superiore malo cõmune est. **S T O M A C H I A F F E C T V S** est, quæ Græci καρδιάκορ appellât, cum eo languente, inter febricitandum corpus immodico sudore digeritur. Accidit ferè ex immodica abstinentia, vel parum tempe-
 10 stua venarum sectione: vel cum aliquid præter rationẽ corpori adimitur. Quare alimento, quod promptam recreandi, calefaciendiq; vim obtinet, succurrendum est. Potu ex vino & niue dato: cibo qui ex valentiore materia
 15 est, & stomachũ corroborare potest. Est cum visceribus inflammatis, potissimum iocinere hic morbus eueniat. Atq; hic contrarij ablationis, & cataplasmatum quæ inflãmatis adhibentur, vsus erit. **A R Q V A T V S** est, quem
 20 & regium morbum nostri, ικτέρος Græci nominât, bilis in summam cutem redundantia. Accedit illi interiorum adustio, stomachi vitium: interim febris acuta, interim nulla. Si præcordia ex inflãmatione tument, cataplas-
 25 mata primum desiderant. Si copia laborant, venæ sectionem. Sin minus medicamẽta quæ bilem euacuent, aut alui ductione, aut per vri-
 nas, aut sudores, aut per nares. **C H O L E R A**
 e. j.

C. GAL. PERG.

duplex est secundum Hippocratem. Altera hu-
mida: in qua (vbi omnes norunt) simul et de-
iectio, & vomitus est: præterque hæc inflatio
est: bilis supra infraque erumpit: intestina tor-
quentur. Accedunt conuulsiones: sæpe etiam **S**
manus cruræque contrahuntur. Remedio con-
tractionibus sunt fomenta calida: balneum post
expurgationem: tum alimenta quæ ex facili po-
nuntur, digerunturque, & stomachum adiuuant.
Alteram siccam choleram vocat Hippocrates **10**
ab eadem prouenientem causa, in ipsâque
consistentem: At citra ventris fluorem & vo-
mitum. Ideoque resolutionem per cataplasma-
ta requirit: nec adiectione, sed inedia opus est.
I N T E S T I N O R V M morbi duo consistunt: **15**
quorum alter tenuioris: alter plenioris infla-
matio est. Hunc εἰλεον, illum κωλικὴν δόθειν
nominant. Recrementum, nec inflatio infra
transmittitur. Hinc quod ex nullo loco transitus
est, dolores vehementissimi, & reuolutiones **20**
ventrem exercent. εἰλεος autem dispositione &
accidentibus acutior, magisque periculosus est.
Alterutro autem morbo extremè laboranti-
bus vomitus biliosi concitantur. Auxilium est
prioris sanguinem mittere quâprimum: absti- **25**
nentia, & cataplasmata inflammationem dis-
cutientia. Efficacius iuuant medicamenta, quæ
κωλικὰ nominant: interiores partes relaxan-

tia. Nam dolores auferunt, somnū conciliant,
 & aluum mouent. A P O P L E X I A ex humo-
 rum crassorum copia generatur, qui principes
 cerebri vētriculos, vnde corpori sentiendi mo-
 5 uēdiq; facultas aduenit, affatim implēt. Quā
 obrem eorū qui huic malo sunt obnoxij (atto-
 niti Latinis vocantur) corpus simul & mens
 stupet. Hippocrates de hoc vitio scribit: Apo-
 plexiam, inquiens, validam soluere nemini li-
 10 cet: Imbecilem haud facile. Sanguis mitten-
 dus statim iam oppressis, modo & ætas con-
 sentiat, & vires sustineant. T E T A N V S, Opi-
 sthotonus & emprostotonus neruorum mor-
 bi graues existunt. Verū vterq; posterior, spe-
 15 cies est conuulsionis neruorum, qui à capite
 descēdentes, corpori motū distribuunt. Nam
 si viscosi humores eos obstruant, affectio ta-
 lis oritur. Quę se scapulis caput annectat, quo-
 minus possit annuere ὀπισθότονον, cum inen-
 20 tum pectori contrahit vt remouere nequeas,
 ἐμπροσθότονον: cum rectam & immobilem cer-
 uicem tendit, τέτανον Græci appellant. Sanat
 venæ sectio, si copię suspicio est. vt videre li-
 cet apud Hippocratē, in illo, qui prolapsus hu-
 25 mi vulnus in caput acceperat. Medetur enim
 eis frigida infusio, si æstas sit: præsertim si non
 gracilis, sed quadratus existat æger. Nam ca-
 loris repercussus excitat. Multi sanè ceratis

C. GAL. PERG.

paulatim recalfaciētibūs & relaxantibus vtun-
 tur : adhæc illitu æqualiter . Postremo lanas
 foli expositas, fomenta & cataplasmata cali-
 da ceruici imponunt. LONGI MORBI in-
 terioribus accidunt hi:cephalæa, morbus co- 5
 mitialis,vertigines oculorū,caligationes,insa-
 nia,melancholia,lethargus,destillatio,rauci-
 tas,grauedo,sanguinis eruptio,suppuratio in
 thorace,tubes, Abscessus in medio latere,ab-
 cessus ī clauiculis, iocineris affect⁹,tenesmus, 10
 dysenteria,lumbrici siue lati,siue teretes,co-
 xarum dolor,articularis morbus,podagra,ele-
 phantia ad exteriores partes spectare videtur.
 CAPITIS DOLOR INTERNVS est,
 quem Græci κεφαλαίαρ appellāt:modo totum 15
 caput per accessiones affligit, modo partem:
 atq; tunc ἐτεροκρανίαρ nominant.Pituita eum
 generat.Auxilium vtriusq; est sanguinis de-
 tractio,vel cucurbitulæ occipitio impositæ:e-
 ductio pituitæ,per aluum purgatio,& epithe 20
 mata quæ inter cataplasmata,vel malagma-
 ta,vel epichrismata scribūtur.MORBUS CO-
 MITIALIS,quem & sacrum vocant,in ner-
 uorum qui à capite descendentes,sensum mo-
 tūmque vniuerso corpori distribuunt,origine 25
 consistit. Caussam eius Plato & Hippocrates
 pituitā & bilem atram indicāt.Homo subito
 concidit:quoniam sentiendi,mouēdiq; mea-

INTROD. SEV MEDICVS. 27

tus obturatur, idq; ob humorum commotionem, quæ à neruorum conuulsione prouenit. Qua de caussa interim vrina sine voluntate prorumpit. Præsidium maximum ad hominis curationem adfert natura florēs impuber-
 5 tatis, & morbum ad iudicationē humoribus natiuo calore exiccatis perducit. Qui pubertatem exceſſerunt, raro aut nunquam sanantur. CALIGINES oculis offuſæ & VERTI-
 10 GINES cognata ſunt vitia morbo comitiali, ab eiſdemq; cauſſis prodeunt, atq; eaſdem ſedes occupant. Hoc tamen intercedit discrimi-
 nis, quòd illæ extrinſecus accidāt: ob quod fa-
 cilius quàm hic curantur,alui ductione, apo-
 15 phlegmatifmis, & vomitibus partim à cibo, partim ieiunis adhuc excitatis. Omnium ma-
 ximè veratro ſuccurritur. MENTIS ALIE-
 NATIO duplici ſpecie inſigni conſtat. Hanc Græci *μανία*, id eſt inſaniam: illam *μελαγχολία*, id eſt atram bilem, appellant. Complures
 20 harum exiſtunt differentiæ, nominum adhuc indigæ. Conſtituitur itaque omnis animi ſtu-
 por ī toto capite. Cauſſa inſaniæ atra bilis eſt. Ob hoc, qui tali vitio laborant, cum impetu
 25 conſurgunt, & violenter quædā manu faciūt. Melancholia naſcitur ex atra bile, humore fri-
 gido & graui. Vnde melancholici demifſi, tri-
 ſtesq; apparent: de omnibus ſuſpicioſi: homi-

e. iij.

C. G A L. P E R G.

num consuetudinem oderunt: solitudine gaudent. Quemadmodum Bellorophōtes à poeta describitur:

Nam cito longa maris remeabat littora solus
Cor edens curis, hominum vestigia vitans. 5

Medetur per aluum purgatio: maximèq; vomitus. adhuc his magis vtrunq; veratrum soluit. L E T H A R G V S morbus est phrenitico contrarius. Est enim marcor, ac inexpugnabilis penè dormiendi necessitas. Huic vitio ob- 10

noxij omniū quæ dicunt obliuiscuntur. Atq; hæc in febre accidunt. Locus affectionis caput est. Nam in membranis cerebri constituitur.

Causa ipsius pituita est: humor frigidus, qualitate sua somnum ac torporem inducens. Cu 15

ratur contrario modo quam phrenitis. Fricantur superiores corporis partes acribus quibusdam & pungentibus: tum ea adhibentur, quæ odore foedo excitāt, mouentq;. Cibi similiter digerentes, secantēsq; pituitam. Fomenta ca- 20

piti admouentur, & cataplasmata quæ exiccan-
di vim obtinent. Aliquando præcordijs. Crebro nanq; hæc inflammatione vexata, neruorum quoq; in capite principium constringūt
grauantq;. H V M O R. à capite oppleto destil- 25

lat interdum in nares: interdū in fauces: aliàs in pulmonem. Atque has tres species Latini grauedinem, raucitatem, & destillationem:

Græci κόρυζα, βρόγχος, & κατάρρευς, siue κατὰ
 σαρμὸν nominant. Grauedini itaque facile &
 breui succurritur: deinde raucitati: Modico sa-
 nè & calido victu, qui tamē validi generis ex-
 5 istat. Destillatio in thoracem non ex facili cu-
 ratur: imò sæpe immedicabilis est. Nam ab ea
 acri & falsa partibus exesis, sanguinis eductio
 sequitur. Cui⁹ tres causæ referuntur. Vel enim
 vasa erosionem passa sunt, ideóque sanguis in
 10 arteriam descendens per os reijcitur. Vel ru-
 pta sunt violenter: vel ob imbecillitatem non
 continent, sed ad aperta eū transmittunt. Dis-
 ferunt nōnihil sanguinis excretio, & reiectio.
 Hæc etenim vel à pulmone, vel aspera arteria
 15 prouenit. Illa à stomacho, & sanguis apparet
 nigrior. Qui ex thorace reijcitur, flauus ma-
 gis & spumans. Deinde hic cum tusse: Alter
 sine illa spuitur. Sæpenumero etiam à capite
 per palati foramina ī os defertur sanguis: præ-
 20 bétque eductionis falsam imaginem. Loci, ex
 quibus sanguis educitur, tres sunt. Primus iu-
 xta tonsillas: vnde minore cum periculo san-
 guis reijcitur, faciliusq; sistitur. Secundus aspe-
 ra arteria: atq; hic morbus curationem diffi-
 25 culter accipit, plenusque periculi est. Tertius
 pulmo, vbi minus omnibus præsidij, magis
 periculi affectus habet. Comitatur enim ma-
 ximè suppuratio & tabes, si Hippocrati fidem

c. iij.

C. G A L. P E R G.

„ adhibemus: Cuius verba hæc sunt: Sanguinis
 „ spuitionem pus, hoc tabes, tabem mors sequi
 „ tur. Nonnulli etiam ex latere sanguinem edu
 ci arbitrantur. At hoc ambiguum est. Salus vi
 tij huius est, sanguinem reprimere: vel venæ s
 sectione aliò ducere: idq̃ potissimum in iuue
 nibus: vel posca sistere, vel in ædia copiam eius
 imminuere, vel simplici quodam medicamē
 to, vt acatia, hypocystide, balauustio, arnoglos
 si succo, atq̃ id genus alijs. Vomicæ præfidiū 10
 vetus sunt ferramenta candentia, quæ thora
 cem exciccent: fluorēmq̃ in exteriores partes
 dirigent. Iuniores consueverunt mitigare cata
 plasmatibus, & alleuigantibus. Deinde repurga
 re medicamētis per os assumptis, priusquam 15
 corpus inficiatur. Inscribuntur autem propriè
 pharmaca ad purulētos. Quæ suppurationes
 medio latere constituuntur, resectæ propriè ad
 linamentum humoris excretionem habent.
 Quæ enim si vniuersim fiat, hominem inter= 20
 imit. Accidunt vero vomicæ quoq̃ sub trans
 uerso septo, quæ (quia se intus oculunt) absces
 sus nominantur, non ex æquo periculosi, nec
 curationi resistentes: plerunq̃ intus rupti hac
 excernūtur, vel partibus exterioribus diuisis. 25
 Diocles memorat etiam pectoris suppurationes
 interim per rupturam arteriæ, quæ ad re
 nes ac vesicam tendit, illapsas, ibi simul cum

vrinis excerni. T A B E S, morbus periculosissi-
 mus, quā Græci φθίσις nominant, à capite ori-
 tur: inde in pulmonē vel thoracem destillat,
 colliquatq; corpus misere: Difficilis eius salus
 5 est: aut nulla. Lactis vsus potui datur dum cō-
 sistit. Loca ficciora conueniunt. Superior Ae-
 gyptus & Libya maximè huic malo meden-
 tur. Hippocrates tabis cuiusdam coxēdicum
 meminit, ἰσχυροδίκη vocās, qua in vomitis cir-
 10 ca os sacrum accidentibus corpora collique-
 scūt. Similiter alterius renum, cui νεφριτικὴ no-
 men dedit. Porrò iocineris & lienis inflāma-
 tiones si in pus vertuntur, & ipsæ mediocri-
 ter corpus consumunt. At hæ suppurationes
 15 multo citius curantur, minúsque periculosæ
 sunt, quàm quæ pulmonem affligunt. Verum
 si minus in vomicas mutantur inflammatio-
 nes, sed crudæ duræq; permanserint, malum
 habitum corpori afferentes, tandem aquam
 20 inter cutem cōciliant. Quatenus autem sim-
 plices extiterint in iocinere, febres continuas
 afferūt. In liene, quartanas vt plurimū. Nam
 huius speciei causā bilis atra est, quæ in illo
 tanquam vase continetur. Vnde quartanæ au-
 25 xilium est, ante rigorem summas partes pro-
 pter humoris frigiditatem fomentis tueri. In
 remissionibus vomitum mouere prodest. A-
 QVAE INTER CVTEM, quam Græci

C. GAL. PERG.

ὕδρωπα vocāt, tres species sunt neotericorum
sententia. Primā ἀσκίτην. Secūdā τυμπανί-
την, Tertiā ὑποταρκίδιον, vel λευκοφλεγματία
nominant. Hippocrates duas statuit. Nā τυμ-
πανίτης & ἀσκίτης eiusdem speciei sunt. Quo- 5
niam in vtraq; nutrimentum in aquam reda-
ctum inter intestina & peritonæum transfun-
ditur. Sed in hac aquæ plus quàm spiritus in
vnum intus cōtrahitur. In illa copiosior spiri-
tus, minor humiditas est. In reliqua solidæ to- 10
tius corporis partes in aquæ naturā transeūt.
Hanc Hippocrates immedicabilem esse scri-
bit. C A V S S A vero cuiusque hydropis est au-
thore Erasistrato inflammatio iocineris & lie-
nis, temporis spacio indurata. Nam cum ali- 15
menti in his visceribus confectionem, atq; in
totum corpus digestionem impediat, in aquæ
substantiam ipsum commutat. Quod ita re-
frigeratū inter intestina & peritonæum trans-
mittitur. Hoc quoq; malum Hippocrati sa- 20
lutis spem nullā habet. Quod si absq; inflam-
matione hydrops, præsertim ἀνασάρκεια eue-
niat, calore genuino refrigerato, nec alimen-
tum in venis amplius continente, sanguis ca-
loris inops aquæ naturam induit: & ex venis 25
ceu oleum ex vtribus defluit. Quousq; enim
sanguis omnino in venis est, ab earum tunica
continetur. Vbi vero in eo pingue exuperaue

rit, vt in obæsis, sanguis effusus adipem generat, aut in aquâ versus, aut dum non continetur, diffluit in locū, qui intestina, & interiorē abdominis mēbranā interiacet, aut per vniuersum corpus diffunditur. Tollūtur duo alij hydropes vel malagmatis exiccantibus, vel medicamentis vrinas cientibus, vel hypelatis purgandi facultate præditis. RENES affecti dolores magnos pariunt. Locus autem male habens non ex facili potest discerni, quòd exterioribus partibus cohæreat: laxiùsque intestinum, κῶλον appellant, ipsis vicinum sit. Quare cum offenduntur, vel externarum partium inflāmatio, vel cōli affectio esse apparet. Non rarò eiusdem intestini consensu renes dolent. Vitia autem quæ in eis consistunt hæc sunt: inflammatio, exulceratio, calculi, vrinæ destillatio. Cum inflammatio renes exercet, nihil per vrinam excernitur: sed dolores excitantur potius, non exactè locum dolentem ostēdentes ob eam, quam dixi, rationem. Verum intolerabiles: quippe qui nec cataplasmatibus cedant, nec imminutione per cucurbitulas facta remittāt. Sola pharmaca nephritica intus accepta præsidio sunt. Si exulceratio eos infestat: interdum purulenta per vrinas excernuntur, interdum cruenta. Cum inest calculus aliquando cruēta, partibus videlicet ab eo exaspe-

C. GAL. PERG.

ratis eijciuntur. Aliquando arenulæ in vrina
 subsident, si friabilis sit lapis, vel etiam recens
 modo nascatur. In remissione sanguinolenta
 vrina redditur, quasi nondum segregata. VES-
 SICAE AFFECTVS hi sunt: vrina spontè s
 profluēs, pytiriasis, calculus, exulceratio, qui-
 bus coles maximè conflictatur. His accedit
 vrinæ suppressio, eiúsque difficultas, & stillici-
 dium. Ex eisdem vero, alijsque caussis profici-
 scūtur. Græci prius vitium ισχυρία: alterum 10
 δυσχυρία: tertium στραγγυρία appellant. In-
 flammationis notæ sunt circa pubem dolores,
 vrinæ excernendæ difficultas. Soluitur cata-
 plasmatis, fomētis, & à cibo abstinētia. Quod
 si excedat, sanguinē per venam mittere conue 15
 nit. Exulcerationis indicia sunt, sanguinolēta
 reiectio interim, interim purulēta, nōnunquā
 muccosa, & circa pubem dolores. Auxiliātur
 epithemata: maximè dulcis bonique succi ali-
 mentū. Adhæc quæ intus adhibētur, & byssi= 20
 ni medicamētum. Relaxationē vesicæ innuit
 vrina cum citra mingētis voluntatem effluit.
 Difficilem morbus curationē aut nullam re-
 cipit. LAPIDEM in vesica esse, digiti in a-
 num immissi deprehendunt. sed ita vt index 25
 ad mediū in summo reflectatur: atque in prio-
 rem vesicæ partē, vbi & lapidem innatantem
 contingunt, referuntque in vesicæ cervicem.

CALCVLORVM differentia plures sunt:
 quidam enim illorū adnati sunt: alij possunt
 auferri. Rursus aliqui vel molles: nonnulli du-
 ri sunt. Itaque magna ex parte adnati difficul-
 5 ter curantur. Ex alijs autem molles dissoluen-
 tibus medicamentis cedunt. Duros & dissolu-
 biles chirurgi tollunt, cutem diidentes super
 vesicæ ceruicem. *ισχυρία* summa est vrinarum
 retentio. *σπαγγυρία* vrinæ stillicidium. *δυσχυ-*
 10 *ρία* vrinæ difficultas. Atq; hæc multis è causis
 proueniunt. Aliquando calculo vesicæ cer-
 uici impacto, aut meatu in totum obstructo:
 vel si intus quippiam relictum sit, aut cerui-
 ci insideat. Vrinæ retentio propter vesicæ in-
 15 flammationem nimiam, aut repletionem im-
 modicam accidit, vesica scilicet ad excretionē
 imbecilli, aut ceruice vehementer ex vrina-
 rum acrimonia contracta: aut ex grumis san-
 guinis iter recludentibus, aut ex humorum
 20 crassitie. Hæc medicamentis resoluentibus o-
 portet discutere. Plenitudinem vacuare ferra-
 mento, quod Erasistratus *καθετήρ* nominat:
 Romanorū literæ S simili. **S T O M A C H V S**
 siue naturaliter, siue male affectus sit, ventris
 25 & intestinorū principium est. Eius vitia sunt:
 inflammatio, exulceratio, sanguinis educ-
 tio, exhalatio, humiditas, fastidiū, alimēti incōti-
 nentia. Inflammationē notat dolor incumbēs.

C. GAL. PER G.

Succurritur fomētis & cataplasmatīs, alimen-
tis quæ nutriant, & facile possint digeri. Exul-
cerationem in stomacho notant propriè pu-
tredo, mordicatio, deglutiendi difficultas. Au-
xiliātur his extrinsecus imposita, cibiq; pro- 5
bè succulenti. Sanguinis excretio ijsdem me-
dicamentis sistitur, quibus ex pulmone eius-
dem reiectio. Exhalationem dissoluunt eua-
porationes, & quæ ructus mouent. Humidita-
tem siccorum esus, & absinthij potio tollunt. 10
Cibi fastidium ex pituita circumiacente ori-
tur, ideòq; exiccare illam ex usu est. Aut à bi-
le supernatante: Vnde stomachus purgandus
est, aut naturæ impotenti functionem appe-
titoria reddenda. Nam oculi quoque propter 15
spiritus visorij imbecillitatem hallucinantur.
Aduersum victus fastidium huiusmodi adhi-
benda sunt, quæ appetitum prouocent, suppe-
ditentq;. Stomachus autem non continet ac-
cepta propter humiditatem, maximè impo- 20
tentiam ac imbecillitatem, sicut dimissa ma-
nus non continet apprehensa. Expedit igitur
corroborare, fortiorémq; ipsum reddere, tum
vniuersū corpus reficere. VENTREM mul-
ta vitia stomacho communia infestant præ- 25
terquam appetentiæ prauitas. Sed concoctio-
nis male obita functio ventriculo propria tri-
buitur, vt quæ potissimum in eo administre-

tur. Quem affectū profluuium sequitur. Reliqua igitur pari modo cum ijs quæ stomachum cruciant curabis. FLUXVS exactè disquirendus est, cur alimento incocto accidat. 5 Et si inflammatio eam pepererit, cataplasmatibus & fomentis occurratur. Si pituita humiditatis parens, victus ratione exiccanda est. Si bilis exuperet, eam purgare vtile est. Si ex imbecillitate provenit vt infirmis, robur corpori faciendum est. Si ab ipsa qualitate eorū quæ 10 cruda assumpta sunt, vel quæ cōsumi non possunt, vel aliter habent, desperanda talium curatio est. **INTESTINORVM** tormina, *δυστερία* Græci nominant, generantur in ventris profluio, humoribus temporis processu 15 corruptis, erodentibus, & exulcerantibus intestina. Fit etiam sine fluxu, primum ab humore acri intestina intus exedenti. Est cū in morbi decessione *δυστερία* contingat, quam curari Hippocrates prohibet, ne alium quempiam morbum maiorem accersat. Illam, quæ ex fluore nata est, reprimentibus & sistentibus sanguinem medicatur. Aliam, cuius origo ex acris cuiusdam humoris mordicatione 20 est, leniētibus, quæq; similibus exulcerata mitigare possint. Diuturno tamen morbo pestifera & putrida solent deijci: tum prosunt immixti pastilli ex sandaraca, calce, auripigmen-

C. GAL. PER G.

to, atq; id genus alijs compositi. Vbi vero non
 fit consueta deiectione, non his vtendū est: quo-
 niam conuulsionem faciunt. Quod si talis in-
 testinorū exulceratio in superiore parte con-
 sistat, pastillorum nullus vsus est. Non enim
 statim ad affectos locos perueniunt. Vbi sanos
 contingunt, perniciem eis faciunt. Verū me-
 dicamentis vtendum est, quæ superioribus lo-
 cis conueniunt: quorūmq; titulus est aduer-
 sus dysenteriam inditus. Ex torminib⁹ inter-
 dum **INTESTINORVM LEVITAS** or-
 ritur, quæ propter multa vlcera nihil cōtinēt.
 Quamobrem medicamenta hic nihil promo-
 uent. Vlcers nancq; ægrè sanescunt. Si vero ex
 intestini imbecillitate contigerit, tum quoq; ¹⁵
 periculosa est, nec ex facili tollitur. Remediū
 autem erit, si curationem moliaris, robur vni-
 uerso corpori ac intestinis adiungere. Cate-
 rum caussa morbi pituita est, intestinis lubri-
 citatem illuendo generans. Succurrit inædia: ²⁰
 & cibi pituitæ contrarij. **TENESMVS** pro-
 priè morbus est recti intestini. Hoc enim in-
 flammatione laborans, cōtinuæ intentiones,
 & frequens desidendi cupiditas exercet. Pro-
 sunt ei fomēta parte inferiore adhibita, astringen-
 tia, tum alimentum ex valenti materia &
 reprimens. Qz si perseueret, nihilq; imminua-
 tur, ptissanæ cremore, & hircina adipe vten-

dum est. L V M B R I C O R V M qui intestina
 excruciant, triplex est species. Quidam enim
 teretes, palmi longitudine, vel etiam maiore
 ad stomachum vsq; proserpunt. Quidam bre
 5 ues, & maiusculis vermibus similes, ἀσκάρι
 δες Græcis appellantur. Rectum vero intesti
 num occupant. Nōnulli lati & oblongi adeo,
 vt in totum exporrigantur intestinum. Græ
 ci vocant κνείας simul & ταινίας. Teretes ita
 10 que ad remedia faciles, maximè pueros: Asca
 rides eos, qui sub pubertatem sunt, infestant:
 nec præsidijs cædunt, nec excernuntur, nisi ci
 bis acriorib⁹, & medicamētis diapicram com
 positis, oleoq; cum vino copiosissimè adiecto.
 15 C O X A R V M dolores, articulorum vitia, &
 podagræ sola inter se magnitudine differunt.
 Cæterū caussis & locis, qui affectum primum
 sentiunt, iisdem constant. Pituita nanq; mor
 bum plerunque constituit. Nerui sustinent,
 20 quibus articuli conseruntur, motūque reci
 piunt. At coxæ dolor, quē Græci ισχιάδα no
 minant, in ipsius articulo ortus ad talos vsq;
 non raro extenditur. Præsidio erit sanguis ex
 talo missus, & cucurbitulæ coxis admotæ: cly
 25 steres acres, quiq; intestinorum tormina quo
 dam modo faciunt. Adhæc cataplasmata aco
 pa, & malagmata adhibita profunt. P O D A
 G R A solos pedes affligit: in statu febris inten
 f. j.

tio est, eoque refrigerantibus opus est. In decli-
 natione torpor cum frigore hominem occu-
 pat, ob quod calefacientia conducunt. A R T I-
 CULORVM vitia, prædictis similes affectus
 sunt, medicamenta therapeutica, tepefacien-
 tia, & victus ratione variam desiderant. M O R-
 BV S quem Græci ἐλεφαντίασιμ, vel ἐλεφαντιάμ
 vocant ab elephanti similitudine nomen for-
 titus est. Nam qui hoc vitio laborant, sum-
 mam cutem aquabiliter crassam, duram, can-
 cellatam, quasiq; squamis quibusdā elephan-
 torū modo exasperatam habēt. Originē mali
 excitat pituita crassa, & atrabilis, vel mucosa
 maximè inhærescēs. Illi enim humores fe-
 ritatem ipsam denunciant. Quare solum ve-
 ratrum siue nigrum, siue albū, præsentaneum
 elephantis est remedium. I M P E T I G I N I S
 duæ species sunt, quæ cutem molestant. Vna
 tolerabilis, mitiorq; est. Altera difficiliter tol-
 litur: ideoq; ἀγρία, id est feram Græci appel-
 lant. Squamulæ in his ex summa cute descē-
 dunt: sub quibus locus rubicundior, ferèq; ex-
 ulceratus apparet. Gignitur affectus à pituita
 falsa & flava bile. Vnde ceu in falguginum va-
 sis fictilibus, ex cute oriuntur squamæ. Succur-
 ritur medicamentis pituitam mouentibus, &
 quæ extrinsecus corpori illinuntur. L E P R A
 quoq; cutis vitium est, sed magis subalbidum,

INTROD. SEV MEDICVS. 34

asperiusq; apparet spydracijs videlicet: ea sunt paulo duriores pustulæ in cute summa exortæ. P S O R A vero scabies exulcerata magis est. Pituita salsa vtrunq; malum propriè pro-
 5 ducit. Pharmaca pituitam cientia, tum quæ extrinsecus illiniuntur, quibus ad lepram & scabiem titulus est, ijsdem succurrūt. V I T I-
 L I G O quam Græci ἀλφορ vocant, duas ha-
 bet species: Leucum & Melanem. Hic ab atra
 10 bile generatur, ob quod magna ex parte me-
 lancholica subueniunt. Leucus à pituita non
 salsa. L E V C E habet quiddam simile alphi
 leuco: sed magis colore terrā albidam refert.
 A lepra variat: quòd leuior hic cutis, minúsq;
 15 aspera quàm in illa sit. Omnia huiusmodi cu-
 rant medicamenta pituitæ trahendæ idonea,
 tum purgationes foris adhibitæ.

DE CVRATIONIS PER ME- DICAMENTA DIVISIONE.

20 **M**edicina duplex est: prima inte-
 riores morbos curat, qua potiss-
 simū victus ratione sanans vti-
 tur. Altera exteriores, citràque
 illam manu nihil peragitur. In-
 25 teriorum medicaminū species duodecim ex-
 istunt. Quædam cephalica, quædam stomati-
 ca dicuntur: Alia concoquunt: alia tussim fã-
 nant, Alia anodyna quæ dolorē leuāt vocant,
 f. ij.

C. GAL. PERG.

alia alexipharmaca sunt, alia purgant. Non-
 nulla propriè ad iecur dolens, inscribuntur.
 Sic ad lienem, ad renes affectos. Est quæ ad-
 uersus vesicæ calculos & vlcera nomen habet:
 similiter ad vuluam. Iam vero stomatica sunt 5
 quæ ad cicatrices cruentas, putridas, erosas, &
 dentes faciunt. Eodem referuntur quæ aphtas,
 & crustas, tum quæ vuam descendantē sanāt.
 Quæ cōcoquunt partim ad stomachi vel ven-
 triculi imbecillitatem conducunt: partim ad 10
 horum inflationē. Partim etiam laterum do-
 lores, vel pulmonis morbos tollunt. Partim
 tabidos salutē restitunt: & spirandi difficul-
 tate maxima distorsos, vt spirare sine sono &
 anhelatione non possint, ἀσπικτὲς Græci no 15
 minant. Partim eos qui non nisi recta cerui-
 ce spiritum trahunt, ὀρθοὶνοικοὶ vocantur. A-
 liqua ex his asperitatem arteriæ, & vocis im-
 pedimentum auferunt. Porro anodyna nunc
 renum affectus, nunc ventris profluvia, aliās 20
 intestinorum tormina, aliās plenioris, tenuio-
 risq; intestini mala: cōmuniter omnia quem-
 uis dolorem mitigant, extinguuntq;. Alexi-
 pharmaca simplicia alia ad aliud venenū vsur-
 pamus. Theriace aduersus omnia, & prius, & 25
 post sumitur. Inter purgantia quædam per su-
 periores corporis partes agunt: quemadmo-
 dum quæ veratro constant: vomitumq; cien-

tia. Per inferiores scammonia, aloe, elaterion, colocynthis, euphorbium, coccum gnidium, atq; his similia purgant. Tertio ordine ab his ponantur, quæ lumbricos latos repellunt: cuiusmodi medicamentum est, quod cerui cornu, menta, & pipere præparatur. Est & quarta species caput tantum per os atque nares purgantium, quæ in capitis, oculorumq; doloribus propriè sumuntur. Adhæc quæ in arqua-
 10 to crebrò in vſu ſunt. Conuenit autem ſuperior purgatio morbis lōgis propulſandis. Tēpus harum eſt, cum morbi intermittunt. Inferior acutis, vt laterum pulmonisq; affectibus. Tempus earum omniū & particularium
 15 acceſſionū remiſſio eſt. EXTERIORVM REMEDIA vndecim ſpecies cōtinent. Alia diſcutiunt, alia concoquunt, alia cruentis ſtatim imponuntur, alia pus mouent, alia repurgant, alia implent, alia reprimunt, alia cicatricem inducunt, alia oculis, alia vniuerſo corpori adhibentur, alia adurunt, ereſypelatis, herpetis, carbunculis idonea. Alia ſunt quæ illi-
 20 nuntur, acopa, & excalfacientia, ad neruorū reſolutiones, articulorū morbos, podagras, tetanos, opiſtothonos, omnēmq; neruorum rigorem. Alia puſtulas in ſumma cute oriētes, leucen, alhum, impetiginem, & lepram purgāt. Quæ digerunt & concoquunt, tuberculis, &


f. iij.

C. G A L. P E R G.

cuilibet id genus abscessui auxilio sunt. Dige-
 rentia constant sale: nonnunquã nitro, vt Cte-
 siphonis compositio testatur. Concoquentia
 resina, galbano, ammoniaco, thymiamate.
 Enæma pharmaca fusci coloris ad recētia cor-
 poris vulnera valent. Quæ propriè viridia &
 nigra sunt, vt barbarũ, capitis mala & canum
 morsus sanant. In vlceribus partim pus edu-
 centibus vtendum est. Inflāmatis leuia con-
 ueniunt, vt tetrapharmacum: Sordidis repur-
 gantia, vt viride relaxans. Cautis implentia,
 supercrescentibus reprimentia, quæ ex mysi
 & squama conficiuntur, in vehementi sangui-
 nis fluore sistendo non parum efficacia. Adu-
 rentibus interim in diducendis partibus, ac a-
 periundis vtimur: velut in abscessuum tumo-
 re: interim cum palpebræ summa cutis rela-
 xatur, & procidit. Aliquando in capitis mor-
 bo difficillimo, quẽ κεφαλαίαν à Græcis voca-
 ri diximus, per altas crustas humores in exte-
 riorem partem educentes assumimus. Adu-
 runt lixiuium, calx viua, auripigmentum, san-
 daracha, alumen, atq; id genus alia. Ex cepha-
 licis medicamentis aliud ad furfures capitis,
 fordes, & papulas valet. Alia cephalalgiam,
 & heterocraniā leuant. Aurium remedia par-
 tim earum inflammationem, partim exulce-
 rationem, partim influxum, partim grauem

audium, partim contusionem iuuant. Oculorum pharmaca septē species habent. Quædam enim ad incipientes lippitudines, quæ *δὲ γλαυκίς, & δὲ κρόκς, & κυκνάρις* Græcè inscribuntur. Quædam ad eorū affectus, vt nardina, & theodocia appellata. Quædam ad fluorem, quæ ex libano, acatia, & ericæ fructu cōponuntur. Quædam ad scabritiem, vt metallica: nempè vstum es, chalcitis, & æris squama. Quinta ad siccam lippitudinem, & scabiem collyriorum species est: tum siccorum oxydercicōn, id est visum exacuentium, quæ in superiorum numero locantur. Sexta humidorum quæ ad suffusiones inscribūtur, ex felle & hyæna potissimum composita. Septima plasmatum species in oculis vehementer inflammatis & dolentibus vsurpatur, ex meliloto, dulci aqua, & teli similibusque confecta. Oblinimus palpebras initio repurgantibus, & cuiusmodi sunt diaglauciu, & diacrocu medicamina. Etiam solo ipso glaucio. Interioribus exiccantia, & lenia ad mouemus, vt nardina & theodocia. Quæ vero ad colorem decorēque formæ conciliandum illinūtur, qualia hydychroo, & sandyce constituuntur, non medicinæ, sed cultus, ac elegantiae sunt propria.

DE OCVLORVM AFFECTIBVS.



Affectus qui totum oculum exercent, hi sunt: taraxis, lippitudo, epiphora, inflāmatio, tumor, inflatio, durities, chymosis, carbunculus, strabismus, contractio, tremor, myopiasis, gangræna, putredo, vlcus, fistula, xerophthalmia, pforophthalmia, sclerophthalmia, proptosis, atrophia. IN MEMBRANIS HI CONSISTVNT: ruptura, exæsis, distensio, 10 anastomosis, crassities, densitas, corrugatio, extensio, raritas. INTERIORES PALPEBRARVM PARTEIS infestāt, aspretudo, crassities, fycosis, tuber, durities, chalazosis, pladarotes, putredo, sarcosis, poriasis. EXTERIORES: guttæ, calculus, phthiriasis, meliceris, gāgrena, phymata, colobomata. IN SUPERIORE PARTE: chritæ, posthia, trichiasis, dystichia, tristichia, palangosis, pyrosis, ptilosis, pforiasis, madarotes, paralyfis. 20 COMMVNES TOTI PALPEBRAE: paralyfis, proptosis, ectropion. ANGVLIS HI ACCIDVNT: encāthis, ancylæ, pterygion, rhæas, prosypsis. EXTRINSECVS: egilops, āchilops. ALBVM AFFLIGVNT: 25 ptydracion, hulus, hypospagma, abscessus, chemosis, cæloma, pterygion, phacosis, icterus, porus, CIRCVLVM OCULI infestāt,

argemō, nephelion, achlys, epicauma, hulus,
 botrion, phlyctis, myocephalon, staphylema,
 hypopiō, ruptura, cicatrix, leucoma, cæloma,
 proptoma, vnguis, pyosis, exulceratio. I N
 5 PVPILLA ESSE SOLENT: suffusio, glau-
 cosis, mydriasis, amaurosis, rhytidosis, nycti-
 lops, hemeralops, myopyasis, diapyasis. MEA-
 TVS EXERCENT: aporexis, parempto-
 sis, symptosis, anthracosis. TARA XIS IGI-
 10 TVR est, cum oculus in exteriorem partem
 conuertitur, tandemq; rubicundus mediocri-
 ter euadit. LIPPITVDO, cum album ru-
 bescit, & palpebræ attolluntur, cū dolore con-
 niuent, ægréque manus admotas ferunt. I N-
 15 FLAMMATIONE rubescunt vehementer
 oculi: palpebræ eleuantur, vt nisi magno ne-
 gocio queas suspicere. EPIPHORA tum in-
 flammationis magnæ vniuerso illatæ corpo-
 ri: tum insignium fluorum cōmune nomen
 20 est. Propriè vero de oculis refertur: vbi cū ma-
 xima inflāmatione, etiam humoris copia in-
 fluxerit. OEDEMA nominant, cum eleuatus
 apparet oculus, & colorem amisit, vel etiam
 ægrè mouetur. Interim album quoq; nigrum
 25 excedit. INFLATIO dicitur, cum subitò tu-
 mescens oculus decolor fit, exuperante pitui-
 ta: vt plerunq; senibus, æstate potissimum so-
 let accidere. SCIRRHOSIS ex inflāmatio-

nis diuturnæ vehementia oritur, carne incre-
 scēte, & subliuida. PROFLVIT oculus cum
 non solum rubet, sed multas lachrymas ex-
 cernit. XEROPHTALMIA, id est arida
 lippitudo, cū anguli hulcera & aspretudinem, s
 pruritūmq; contraxerunt: palpebrę rubent, &
 lachryma falsa & acris profluit. SCLERO-
 PHTALMIA, quasi dicas duram lippitudi-
 nem, est cū palpebrę duriores sunt, oculi ru-
 bent, & cū dolore quodam grauescunt. PRO- 10
 PTOSIS appellatur, vbi ab inflammatione
 moti sede sua prociđūt. ATROPHIAM no-
 minant, cum ex longa imbecillitate, vel alia
 quadam latente causā paululū quasi propul-
 sus, deinde cauus ad radicem, cum dolore mi 15
 nor euadit, obscuręque aut nihil omnino vi-
 det. SCABRAE dicuntur palpebrę, cum e-
 uersę sanguinolentiores apparent: adhęc ma-
 gis asperę carnosęque, & fici acinis similes.
 CRASSAE vocantur, vbi euersę duriores ijs 20
 quę naturaliter se habent, existunt, & scabris
 magis carnosę. SYCOSIS, id est ficus, accidit
 cum in palpebrarū parte interiore carni quid
 simile enatum fuerit: quod emineat, oculus
 totus grauescat. TYLOSIS nuncupatur, cum 25
 in palpebris aspretudines ex senectute crassi-
 ores, albidę & parum sensiles extiterint: eóq;
 minus demoliri licet. SCLERIASIS est tu-

mor palpebræ cum rubore dolorēq; difficul-
 ter remedijs cedit. Durat magis quàm inflā-
 matio. CHALAZIA rotunda in palpebris
 tubercula sunt, & mobilia: simulq; digito huc
 5 vel illuc impelluntur. Nomen à similitudine
 grandinis acceperūt. PLADAROTES, cum
 palpebræ mollescent nimis. PVTREDO cō-
 munis est omnium partium. Palpebræ ex ea-
 dem laborant, vbi tumentiores fiunt, & assi-
 10 duè diffluunt, adipem paulo copiosorem for-
 titæ. CRITHE quæ & POSTHIA dicitur,
 tuberculum est paruulū in eisdem palpebris
 supra pilorum locū. Figura hordeo simile, vn-
 de appellatum est. Generantur alia quoq; tu-
 15 bercula in medijs palpebris eodem appellata
 nomine. LITHIASIS albida quædā & cras-
 sa, callis, lapillisq; similia, quæ oculum pre-
 munt, in palpebris retorsis ostēdit. PHTHIA-
 RIASIM vocamus, cum palpebrarum pilos
 20 exigui pediculi infestant. DITRICHIASIS
 laborat oculus, cum pilis naturalibus alij sub-
 nascentes ipsum premunt, fluorēmq; conci-
 tant. PTILOSIS est cum alij quidem sub-
 nascuntur, naturales autem collapsi, fractiq;
 25 stimulant ac pungunt. PHALANGOSIS,
 cum pilorum subnascentiū duplex, triplēxve
 acies, vel in superiore, vel in inferiore palpe-
 bra prouenit. RESOLVTVS oculus dicitur,

C. GAL. PERG.

vbi naturali motu destitutus, neque sursum,
neque deorsum intendi possit: verum sentien-
di expers consistat. Frequenter hoc mali par-
tibus oculi accidit. ECTROPION palpe-
brarum vitium est, cū exulceratis oculis plus s
extra feruntur. ENCANTHIS, vbi ex vlce-
re caro in angulis iuxta nares supercreuerit,
quæ palpebras parum diduci patitur. Nautæ
hoc vitij peculiare habent. VNGVIS vero est
in albo oculi præter modum exulcerato, car- 10
nēq; oppleto, membranula nervosa, quæ ori-
ens ab angulo, ad pupillam & verticem eius
peruenit. RHOEAS, cū anguli foramen ex-
latēte quadam caussa, aut praua curatione pa-
tescit, vt lachrymas continere non possit, sed 15
postea semper humorem dimittat. COHE-
RESCVNT frequenter palpebræ cum albo
oculi, vel nigro scilicet, cum in vtroq; fuit hul-
cus negligēter curatū. Et si nigro cohæreant,
visus omnino prohibetur. Sin albo, minus. 20
Græci hoc malum ἀγκυλωσις appellant. AE-
GILOPS, vel ANCHILOPS, abscessus qui-
dam est in angulo, qui naribus propior est,
pus continens: aut ex æso osse, pituita assidue,
vel ad angulum, vel vsque ad nares destillat. 25
SPYDRACION de toto corpore, interim
de oculi albo dicitur. Est autem velut pustula
in summo rubicundum. HVL CVS oritur

in albo vel nigro, cū summa cuticula, quam
 Græci *ἐμπέριμ* nominant, diuisa lunæ for-
 mam vel rotundam, cauam, similis coloris,
 vel subalbidī acceperit. **HYP O S P H A G M A**
 5 vocant, cum vasis ab interiore tunica ruptis
 ab ictu, sanguis intra albi excessum, & interi-
 orem tunicam coierit. Atq; oculi color sta-
 tim cruentus, post liuidus existat. **C H E M O**
S I S ex inflāmate vehementi vtrasq; pal-
 10 pebras in exteriorē partem detorquet, ne to-
 tum oculum contegant. Propriè vero chemo-
 sis, cum album vtraque iridis parte inflāma-
 tione afficiatur: iuxta irim cauum hiatularū
 similitudine appareat. **C A E L O M A T A** sunt
 15 rotunda & caua hulcera, racemis latiora, quæ
 in oculis circa irim nascantur. **A R G E M O N**
 in iridis circulo, vel in albo, interdum etiam
 nigro, hulus rotundum & subalbidum ori-
 tur. **N E P H E L I O N** summæ cutis hulus
 20 paulo maius argemo, albidum. **A C H L Y S** est
 circa totum nigrum extremi hulceris cicatri-
 cula tenuissima, aeri caliginoso assimilis. **E P I**
C A V M A, cum extrinsecus epidermis adusta
 hulus contraxerit, vel etiam paulo altior q̃
 25 epiphora magna fiat. **B R O T H Y O N** est hul-
 cus cauum, purum, angustum, centris rotun-
 dis simile: hulusculo altius. **P H L Y C T A E**
N A M vocāt, vbi per exulcerationē, vel etiam

C. GAL. PER G.

fine hac exterior ceratoidis tunicae membra-
 na tenuissima & sublimis elata, intra se hu-
 morem collegerit: aut sub tunica crassior hu-
 mor currens phlyctenam pariat. MYOCER-
 PHALON morbus est, cum tunica priore 5
 iuxta irim, exulcerationis vitio exarsa, secun-
 da inclinat: vt ceu muscoli caput referre vi-
 deatur. STAPHYLOMA TE oculi pupilla
 cum inflammatione & dolore attollitur: Et al-
 bum colore acino vuæ simile redditur. HY- 10
 POPION vniuersam irim pure occupat, vel
 eius dimidium. REXIS est exulceratio ab
 ictu, vel alia quadam causa, in alto integras
 subinde membranas diuidens, vt etiam hu-
 mores, quibus videndi facultas administratur, 15
 effundat. CICATRIX appellatur, vbi in ni-
 gro oculi ex alto hulcere membranae crassities
 emergit: & color magis albescit. Accedit quo-
 que albi membranae, sed non perspicitur. LEV-
 COMA nihil à cicatrice differt, nisi quòd ex 20
 hulcere maior cicatrix simul & crassior ī iri-
 de nascatur, quam leucoma nominant. CLA-
 VVS cum leuitate & albedine, velut carnosae
 cicatrix, durum nigri tuberculū est. Frequen-
 ter etiam albo nigro cohærenti euenit. SVF- 25
 FUSIONEM quidam interpretantur, cum
 humor quidam in pupillam destillauerit, hæ-
 reatq; sæpe pertinaciter adeo, vt visum offen-

dat, vel in occurrētibus hebetet. GLAUCO-
 SIS est humoris, quem Græci κρυσαλλοειδής vo-
 cant, in album atque aqueum colorem mu-
 tatio, cuius gratia visus impeditur. IN MY-
 5 DRIAS I pupilla quidē nihil colore variat,
 dilatatur autē magis, vt iridis circulo sit pro-
 ximus, & visioni noceat. PHTHISIS appel-
 latur, dum pupilla arctē coit, vt stimulo assi-
 milis fiat, tum hebetior, tum rugosior, vt ex
 10 imbecillitate periculosa, aut ex capitis dolo-
 re vehementi. SYNCHYSIS, dum humores
 oculorum non in loco consistunt, proprium
 ordinem seruantes, sed huc illūcque feruntur.
 HEBITVDO summa visionis sine causā
 15 euidenti offensio. NYCTILOPES vocan-
 tur, qui die vident obtusius, sole occiduo acri-
 us: Nocte magis adhuc: vel contrā. Die pa-
 rum. Vesperi aut nocte prorsus nihil. MYO-
 PES vicina vident: remota non item. DIA-
 20 PIESIS humor exiguus in pupilla, qui diffi-
 culter euaporat ac discutitur, suffusione sicci-
 or. APORRHEXIS est, quando meatus à
 cerebro & meninge in oculū descendens, ex
 ictu capitis, vel casu ex alto disruptus, cæcita-
 25 tem affert. PAREMPTOSIS, vbi meatum
 qui à basi cerebri veniens, oculo videndi fa-
 cultatem tribuit, humor adaperto, vel rupto
 vase incidit, obturatque eum. Vnde cum do-

lore visus offenditur. SYMPTOMASIS accidit cū meatus ex tabe, vel imbecillitate fit arctior, conciditq̃. Quod vitium vt rarū est, sic remedijs ægre cedit. CARBUNCVLVS crustosum est hulus, depascens cum fluore, & inflatione: interim in toto corpore, interim in oculis febribus orientibus.

DE EXTERIORIBVS CAPI-

TIS AFFECTIBVS.

EXtrinsecus accidunt hi, qui inter longos ascripti non sunt.

DE CALVARIÆ FRACTVRIS.



Aluariae fracturarum differentiae quinque existunt: rhogme, engisma, ecpiesma, apochema, & camarosis. Distentio futurarum hydrocephalon, furfures, ptyriasis, meliceris, atheroma, fauus. Porro eam partem quæ capillo tegitur, & mentum occupant, alopecia, ophiiasis, caluities, phalacroasis. Pili omnes fluunt, exterminantur, quassantur, scinduntur, in puluerem rediguntur, subflauescunt, canescunt. Oculorum morbi separatim conscripti sunt. Aurium contusio, pterygomata, fractura cartilaginis, sordiū vel exuperantia, vel defectus, grauis auditus, surditas, puris fluor, cursus graueolens. Nares excruciant ozæna, polypus, hulus, fractura, peruersio, compressio, simo-

sis. Os infestat gingiuarum putredo, dentium
 erosio, eorūmq; dolor: & cū è sede sua labant,
 abscessus, epiglottis, epulis, parulis, aphthæ,
 crustæ, paristhmia, vva, ficus. Faciem occupāt
 5 ephelis, vari, lentigo, ossium fractura. Disten-
 sio cōmissurarum, eluxationes maxillæ à ge-
 na. Ceruicē habent synanche, cynanche, stran-
 gulatio, vertebræ excidentes, strumæ, steato-
 mata. Scapulas malè habet, verticis ipsarū fra-
 10 ctura, distētio. Iuncturā cubiti occupant me-
 liceris, atheroma, steatoma, humor aqueus.
 Primæ palmæ partem ganglia. Digitos ma-
 nus & pedis chymethla, rediuiū. Quamcū-
 que corporis partem inflāmatio, tumor, infla-
 15 tio, duricies, abscessus, hulus purum, hulus
 sordidum, cauum, supercrescens, crustosum,
 ficcum, fluēs, subpascēs, callosum, fistulosum,
 putredo, phyma, dothien, therminthes, phy-
 gethlon, chalaza, pagedena. Phlyctides, carbū
 20 culi, epinyctides, eresypelas, herpes. Mamil-
 las, tum naturalia sexus vtriusque vexant car-
 cinomata. Quamlibet corporis partem im-
 petunt carcinoma occultum, carcinoma vl-
 ceratum, therioma. Inguina, bubones simpli-
 25 ces, phymata purulēta inuadūt. Genu, gony-
 algia, rheumatismi, calli. Poplites steatoma-
 ta, anchylæ. Tibiam, varices. Suram durities,
 chironia hulcera. Sūmam pedis partem, ni-

C. GAL. PERG.


gredines, necrosis, podagra, fistula. Calcem, lepis.

DE CVTIS AFFECTIBVS.



Vtē, totiūsq; corporis partes ex-
agitant lepra, pſora, alphos albus, 5
alphos niger, leuce, impetigo ſim-
plex, impetigo agreſtis, dracorti-
afis, acrochordones, thymi, myr-
mecia, clauus, calli. Quidam horum ex poda-
gra, & articulari morbo quadam ex ſeſe oriū- 10
tur. Sedem afficiunt hæmorrhoides cecæ, ri-
mæ, proptofis, cōdylomata, pylides. Aduenit
etiam vuluæ proptofis, cum in exteriora pro-
cidit. Scrotum habēt, enteroccele, cirſoccele, epi-
plocele, ſarcocele, poroccele, ſteatocele. Totius 15
corporis oſſa patiuntur cariem, ſpacelum, fra-
cturam ſine vulnere, vel cum vulnere, ecbyr-
foſes. Fracturarum differētię quinque ſunt. Pri-
ma ſchidacedon facta, id eſt, vt latini homines
intelligāt, per rectitudinem. Altera per tranſ- 20
uerſum καυληδὼν Græci dicunt. Tertia rapha-
ni in morem ῥαφανιδὼν. Quarta caryedon, po-
ſtremo alphitoedon facta. Nigreſcūt interim
oſſa in fracturis, interdum ſine his. Articulis
accidunt, paragoga, è ſede propria motio, elu 25
xatio, luxatio, colligatio, porofis, rheumatif-
mi, diſtenſio commiſſurarum.

INTROD. SEV MEDICVS. 42
DE CHIRVRGICA.



Chirurgia est alieni, vt propriè vo-
cant, per incisiones, compositio-
nēsq; cum via quadam & ratione
ablatio: adhæc vulnere atq; hul-
cerum humano corpori acciden-
tiū curatio. Primariæ eius actiones duæ sunt:
compositio, & diuisio. Harū rursus variæ sunt
species. Compositionis quidē, fractorum os-
suum coniunctio, & deligatura. Luxatorum
repositio, intestinorum, quæ prociderunt col-
locatio: adhæc vuluæ, & recti intestini. Curto-
rum applicatio, siue adductio, vt in naribus, la-
bris, atq; auribus. Diuisionis species: simplex
incisio, præcisio, hypospatismus, periscythif-
mus, angeologia, excisio, adustio, rasio, lima-
tio. Simplicis sectione in abscessibus vniuersis
vtimur. Diuidendum vero membrum est re-
cta linea, non trāsuersa. Præcisioni locus est in
alis, inguinibus, natib⁹, & anu. Hypospatismo
in facie, cum oculi fluūt. Periscythismo in sin-
cipite, & colis pellicula, quam præputium vo-
cant, nigricante. Excisioni in membris nigre-
scentibus, & capitis fracturis. In ossibus om-
nibus, alijsq; multis vstio, rasio, limatio vtilis
sunt. Vstio candentia ferramēta requirit: pro-
priè in ijs malis quæ depascūt, & oculis rheu-
maticis, coxis, vel etiam interioribus. Etenim

g. ij.

in tabidis candentia ferramenta assumuntur,
 & in lienosis: tum i humeris, qui in alam ex=
 cidere consueuerunt. Insuper in ægilope, in ni=
 gricantibus, vel ijs quæ propter adaperta va=
 sa aduruntur. Postremo in alijs sanguinis pro=
 fluxionibus. Hæc itaque in capite consistunt,
 quæ à manu auxiliantur. Fracturarum gene=
 ra sunt hæc. Rogme, empisoma, ecpiema, a=
 pochema, & camarosis. Nonnullorum sen=
 tentia additur trichiasis, summa ossium in=
 sculptio. HYDROCEPHALON quatuor
 species obtinet. vnâ cum intra cerebrum &
 inuolucrum eius humor subsidet. Alteram,
 cum intra membranas & ossa: Tertiam, cum
 intra os, & pericranium: Reliquam, vbi os &
 cutem interiacet. Circa cutem oriuntur me=
 liceris, atheroma, & extrinsecus incidens alo=
 petiasis. Itaq; alopetias laniamus, meliceridas
 & atheromata obliquè, vel simpliciter sum=
 ma cute diuisa, deinde tunicis per digitos a=
 uulsis, cum ipsis humoribus, qui insunt aufe=
 rimus. Hydrocephalon sub cute & pericranio
 duabus, vel tribus rectis lineis incisis euacua=
 mus. Quod sub ossibus est, excidimus. Quod
 tandem intra meningem cerebrum incidit, in=
 sanabile est. Onus fracturarum caluariæ spe=
 cies excisione administratur, quæ id quod in
 ossibus fractum est, aufert. Veteres igitur mo

diolis teretibus secantes ipsa excidebant. Pos-
 teri terebris vsi sunt, ægros in sedile, tum se-
 ipsos collocantes. Hac tempestate ægris tan-
 tum sedem exhibēt. Ex oculorum vitijs, hæc
 5 manus præsidium expetunt, trichiasis, hyati-
 des, encanthides, vngues, staphylomata, suf-
 fusiones, fluores diuturni, & excedentes, pal-
 pebrarum calculi, conglutinatio: in angulis o-
 culorum ægilops. Palpebras itaque prociden-
 10 tes sursum attrahimus: id quod præter natu-
 ralem habitum est auferentes. Vbi alius pilo-
 rum ordo subcreuit, acus candens ab angulo
 sub ipsis radicibus, immittitur. Hydatidas sin-
 gulatim tollimus. Encanthidas, vngues, & sta-
 15 phylomata præcidimus. Quæ solum ad ipsas
 radices per medium transuere acu lina ducen-
 te oportet. Vngues vel encanthidas, vel lino,
 vel haniulo attrahimus. Hypochyma pun-
 ctione tollimus, iuxta minorē angulum, ver-
 20 sus pupillam adhibita. Deinde in eius sum-
 mo concretum pupillæ humorem fractioni-
 bus radentibus: stringentesque, ne suspitias.
 Hypospatismus, periscythismus, & angiolo-
 gia fluorem sistunt. Hypospatismus itaq; tri-
 25 bus fit supra frontem diuisionibus. Post fer-
 ramento quod spathomolā appellant per cor-
 pora quæ interiacent, transmissio. Periscythis-
 mus est, cum transuersis lineis coronæ modo
 g. iij.

frons secatur. Altera ipsius parte paulo supe-
 rius quàm tempora sunt, quædam triangula
 amputantur, Græcorum literę Δ similia. An-
 giologia perficitur vasis latentibus à tempo-
 re ad tempus in profundum diuisis. Palpebra-
 rum calculis medemur magna ipsarum diui-
 sione: qua lapides integrè auferimus. Conna-
 tas palpebras scalpello aperientes siccis medi-
 camentis diducimus. Aegilopas ad os vsque
 excidentes ferramentis candētibz adurimus. 10
 Sunt autem qui loco ferramentorū candē-
 tiū terebra os forant, vt in naribus. Polypum,
 qui in naribus nascitur, acuto ferramento ab
 osse resolvimus: & rasorio postea radices de-
 metimus. Ozænæ raro ad sanitatē proficiunt: 15
 curatio vero earū in ijsdē versatur. In ore epu-
 lidas, & parulidas diuidimus, vbi suppuratio
 se ostenderit. Vuas discedentes, siue collapsas
 nimiū incidimus, vossella præhendētes. Den-
 tes eximimus remouendo. Durities exceden- 20
 tes naturam in tonsillis aduersis plagis ampu-
 tamus. IN CERVICE steatomata, & stru-
 mas, summa cute diuisa, & digitis auulsa, tum
 vasorum complexu dissoluto tollemus. Gan-
 glia quæ in metacarpis vt plurimū eueniūt, 25
 & mulieribus lana victum quæritantibus in-
 terim extundimus: interim ceratis mollita cu-
 ramus. IN ALIS tubercula, & strumas præ-

cidimus. Similiter in inguinibus. Abscessus inter costas diuidētes non vniuersim, sed moderatē, paulatimque puris excretionem molimur: sunt qui exurant eos. C A R C I N O =

5 M A T A in multis corporis partibus, maxime foeminarum mammis oriūtur. Præcidimus vbicunq; fuerint, & ferramentis peruruntur non admodum candentibus, siue ignitis. Non desunt qui alijs ferramētis ignitis simul

10 secantibus & adurentibus vtuntur. Exomphali omnes quibus vmbilicus extuberat, appellantur. Differentia triplici comprehendūtur. Quidam enim pneumatomphali, quasi qui spiritum sub vmbilico collegerint. Alteri en-

15 teromphali, quibus intestina ad vmbilicum procedūt. Reliqui hydromphali, qui aquam sub vmbilico gestant. Omnes differentia manu sanantur, lino duplici per acum immisso, & vmbilico cōstricto. Hydropicos paululum

20 supra vmbilicum pungimus ferro, quod myrsinen vocant. Apellarum duplex curatio. Horum qui intrinsecus: illorū qui extrinsecus orbiculatim in summa cute diuidūtur, vt glans intus attrahatur. Qui dicuntur atreti, siue fo-

25 ramen habeant tenue, aut nullum omnino, auxilium capiunt hoc pacto: Acuto specillo immisso, id adaperitur: deinde digito submittentēs vndique dissoluimus. Lapides in vesi-

g. iij.

C. G A L. P E R G.

ca habentes secamus, calculum vesicæ collo
stringentes, excisorio cultro diuidemus sub-
ito adiectam materiam, & ferro ad id idoneo
calculum auferemus. Quibus vrina propter
copiam non redditur, vesica distenta vt remit-
tere se nequeat, per fistulam vrinam elicimus.
Immittitur autem in anum per meatum ad
vesicam vsq̃. Tumorū qui scroto accidunt,
septem species sunt: hydrocele, porocele, stea-
tocele, sarcoccele, epiplocele, cirsocele, entero- 10
cele. A quibusdam hæc adduntur, hyderente-
rocele, sarcoepiplocele. In his qui hydrocele
laborāt, scrotum diducendum est, & vbi ma-
ximè venosum est, humorem tunica compre-
hensum euacuare oportet, & tunicæ superua- 15
canea auferre. In quibus sine tunica est, excer-
nere humorem sufficit. Steatocelas, & poro-
celas similiter excedentes sinistra manu seca-
re conuenit, scrotum postea in superficie di-
ducere, donec adipi, vel callo, vel alij cuicun- 20
que incidamus, & hoc auferemus. Pari mo-
do sarcocelici tractantur. Oportet autem car-
nem albicantem præcidere: rubram emollire,
& in atrum colorem mutare. Adhæc reliqui-
as adimere expedit. In cyrsocelis extendes va 25
ricem hamulo: in superficie diuisum auelles,
relicta ceu digiti parui latitudine. Reliquum
extensum absca. Cura vero nō mediocris ad-

hibenda est in nervis illis complicatis, κρεμα-
 σήγας Græci vocant, & testiculis. Enteroceli-
 cos, & epiplocelicos ita secamus, reprimentes
 intestinum, vel omentum diligenter, mox se-
 5 minariū meatum: auferemus quā fieri po-
 terit commode. Sin minus, peritonæum attra-
 hentes, & fune acceptū præcidimus. Hæmor-
 rhoidas lino duplici per sedem ipsam eleuan-
 tes, complectentēsq̃ue post horas duas absci-
 10 dimus. Fistularum nonnullæ perforatæ non
 sunt, os tantum habentes. Quædam perfora-
 tæ vel intus in anum, vel extrinsecus. In per-
 foratis in anum specillum immittes: mox di-
 gitum in sedem adferēs, intestinum attrahes
 15 mucrone specilli, idēq̃ amputabis, ab inferiore
 loco incipiens, perforatas extrinsecus specilli
 acumine penetrare vtile est omni sano corpo-
 ri. Sunt autē qui varices in cruribus primum
 extrinsecus incisionibus insigniunt: post hæc
 20 summam cutem diducūt: deinde hamulo va-
 ricem attrahentes, deligant, atque tunc absci-
 dunt. Dracontia varicibus similia sunt: ma-
 gnum vero dolorem dum paululum promi-
 nentes mouentur, concitant. Oportet autem
 25 deligatis, vt varicibus, summam cutem detra-
 here, sicq̃ præcidere. Clauos cultello, acrochor-
 donas, thymas, myrmecias excedentes adu-
 rimus, vel pforico illinimus. Curta in narib⁹,

auribus, oculis, hoc modo ad naturalem habitum restituuntur: labra scalpello vndiq; deradentes cruentamus: deinde adducentes densius fuimus. Labra vtrinque vbi connata sunt inuicem intus & extrinsecus diuidimus, distendimusque, nec caro inde relaxatur. Quæ auribus, vel naribus curta accidunt, cum fuerit cartilago diuisa, producere aliam conuenit: vel sic consuere lanæ filo.

DE OSSIBVS CONFRACTIS. 10

Fracta membra ex distensione quidem in rectum restituuntur. Ex deligatura callo obducuntur. Caluaria ergo fractiones quot modis accidunt, quomodoque curentur, diximus. Et si 15 in facie fractura contingat vt in capite, sanare conuenit, osse, quod affectum est, adusto. Sciendum autem est, quæ ossa fracta curationem non recipiant. Si igitur nares confractæ sunt, non recte possunt restitui. Aurem etiam 20 frangi scribit Hippocrates, quoniam eius cartilago imitatur os: ægerrimeque in pristinam figuram reducitur. Verum si ex palato fracturam accipiant, resimæ euadunt, & insanabiles. Porro si clauicula, vel iugulum, vel alia 25 quædam costa, & hæc frequenter refarciri non possunt. Epithemata in iugulo adhibenda sunt, ipsumq; ab ala, ad alam deligandum est. Cæ-

terum si quod maiorum membrorū fractum
 sit, vel minorum partium, vt digitorum no-
 di, vel ossa volæ, vel oppositæ eius partis, vel
 tarfi, omnia quidem in magnis caulædon, vel
 5 raphanedon, & schidacidon franguntur. In te-
 nuibus caryedon, vel alphitidon. Omnia er-
 go fracta deligantes, extendentesque admo-
 dum vehementer & valide diducere, & mul-
 tum inuicem separare oportet vt restauren-
 10 tur, pristinamque figuram recipiant. Non au-
 tem in rectum omnia restitui debent, sed ad
 proximi cui cohærēt, membri figuram. At si
 os rectum sit, rectè: si obliquum, vel alio quo-
 uis modo curuum, aliter. Modus autem de-
 15 ligaturæ præparandæ hic est, ad omnē fasciam
 ex lintheis veteribus, tum latitudine, tum ma-
 gnitudine mēbro respōdens. Latitudine qui-
 dem in maximis digitorū quatuor, vel quin-
 que. In tenuioribus non minus digitorū triū.
 20 Deligaturæ hæc ratio. Prima fascia ter nobis
 sursum versus feratur vt plurimum. Altera di-
 midio longior in eodem loco incipit, euariās
 deorsum quidē, ad superiora vero reducitur.
 Illinenda hydrælæo, vel ænelæo, vel glycelæo
 25 aduscq; triduum expedit. Post cerato laxo, vt
 oleum crassum videatur. Verum iunctura ita
 paretur ne nimium astringat, vt alienetur, sed
 mediocris sit vt membrum conquiescat: nec

laxa, vt contineatur, & repellat influxus, inflā
 mationis. Pōst splenia triplici, quadrupliciꝫ
 figura adhibeantur, quæ membrorum crassi-
 tiem impleant. hæc quoque ipsa stabiliant, ne
 sibi mutuo incidant, nec dissidentia interual- 5
 lum relinquunt. In his fascia cōuenit triplex,
 quæ à fractura deorsum veniens, sursum rur-
 sus feratur, ibiꝫ finiat. Soluere membrū ter-
 tio die, interim septimo si necessitas exigat,
 debetis. Inde licebit ferulas circumponere, in 10
 teruallo distantes, quæ ossa in sede sua conti-
 neant, & in quam partem fractura inclināt, ab
 ea latior, valentiórque ferula adiungenda est.
 Maximè hic modus deligaturæ cōfert ijs, quæ
 alphitedon fracta sunt, cū vulneribus & mul- 15
 ta contusione musculorum: in quibus etiam
 linamenta madentia imponenda sunt. Lina-
 mentorum sunt quinque species: aliud flexi-
 le, aliud rasile, aliud succidum, alia quæ Græ-
 ci ἐμυχνιωτὸν & παπσκοτὸν appellant. Luxa 20
 ti distenduntur: repositio membri distensio-
 nem propriè sequitur. Omnia in Hippocrati-
 co subsellio restituuntur, simul & tensa, & com-
 missa. Caput luxatur, nam articuli circuitum
 obtinet. Maxilla in priorem partem propelli- 25
 tur, sed modo altera parte modo vtraque. At
 solis manibus in sedem suā compellitur hinc
 illincꝫ ad malas adducta. Humerus cum in

alam tantum excidit, lignea spatula cum in-
 tēſione in ſedem reducitur, ſunt & alia inſtru-
 menta, quæ palæſtrica nominant. Cubitus in
 omnes quatuor partes excidere poteſt. Si in
 5 exteriorē, interiorēve diſtentione reponi-
 mus. Si in priorem, vel poſterioſam ſine di-
 ſtentione reſtituimus. Manus, & eius oppoſi-
 ta pars, adhuc digiti, modicè diſtenti repo-
 nuntur. Quævis ſpinæ peruerſio, tumor, & ſi-
 10 nus, reſtaurari non poſſunt. Femur in omnes
 quatuor partes promouetur ſepiſſime in inte-
 riorem, deinde in exteriorē, raro admodum
 in priorem, aut in poſterioſam. Genu quo-
 que in exteriorē partem, interiorē, & po-
 15 ſterioſam excidere notiſſimum eſt, in prio-
 rem nequaquam, cum idem oppoſita patel-
 la, ipſa quoque caput tibiæ contineat. Talus
 modicè prolapſus ægre reſtituitur. Si magna
 ſit luxatio, ægerrime. Periculosa enim nimis,
 20 & niſi cum vulnere accidit. In digitis nihil vl-
 tra fieri debet quàm quod in his, qui ſunt in
 manu poſitum eſt. Commiſſurarum interual-
 la, vt in facie, cubiti & radij, tibiæ & furæ, me-
 tacarpij & volæ, tarſi & plantæ in veterem fi-
 25 guram reſtituuntur. Porro quæ membra ni-
 greſcunt, vel depaſcuntur, ſiue ex fracturis, ſi-
 ue violēta aſtrictione tota ſæpe adurimus. Si-
 militer in ijs facimus, quos venenatæ fere mo-

C. GAL. PER G.

morderunt, mox ferramentis probè candentibus pastionem sistimus. Deinde ubi crustæ expurgatæ fuerint, tanquam vlcera curamus. Venenatorum morsus neque cito ad cicatricem ducimus, sed frequentius hulcerum modo fluorem ex eis concitamus.

τίλος.

C. GALENI PERGAMENI
INTRODVCTIONIS SEV ME


DICI GVINTERIO IOANNE

ANDERNACO IN

TERPRE

TE:

FINIS.



DECLARATION

OF THE

PROCEEDINGS

OF THE

HOUSE OF COMMONS

IN PARLIAMENT ASSEMBLED

IN THE YEAR OF OUR LORD ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND SEVENTY

SIX

IN THE FIRST YEAR OF THE REIGN OF HER MAJESTY QUEEN ANNE

SECOND

IN THE FIRST YEAR OF THE REIGN OF HER MAJESTY QUEEN ANNE

SECOND

IN THE FIRST YEAR OF THE REIGN OF HER MAJESTY QUEEN ANNE

SECOND

IN THE FIRST YEAR OF THE REIGN OF HER MAJESTY QUEEN ANNE

SECOND

IN THE FIRST YEAR OF THE REIGN OF HER MAJESTY QUEEN ANNE

SECOND

IN THE FIRST YEAR OF THE REIGN OF HER MAJESTY QUEEN ANNE

SECOND

IN THE FIRST YEAR OF THE REIGN OF HER MAJESTY QUEEN ANNE

SECOND

IN THE FIRST YEAR OF THE REIGN OF HER MAJESTY QUEEN ANNE

SECOND

IN THE FIRST YEAR OF THE REIGN OF HER MAJESTY QUEEN ANNE

SECOND

IN THE FIRST YEAR OF THE REIGN OF HER MAJESTY QUEEN ANNE

SECOND

IN THE FIRST YEAR OF THE REIGN OF HER MAJESTY QUEEN ANNE

DECLARATION
OF THE
PROCEEDINGS



DECLARATION
OF THE
PROCEEDINGS
OF THE
HOUSE OF COMMONS
IN PARLIAMENT ASSEMBLED
IN THE YEAR OF OUR LORD ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND SEVENTY
SIX
IN THE FIRST YEAR OF THE REIGN OF HER MAJESTY QUEEN ANNE
SECOND

CLAVDII GALENI
PERGAMENI DE SECTIS AD
MEDICINAM INTRODVCTIO.



5 **M**edicæ artis scopus, sanitas est: finis, ipsius possessio. Porro medici necessario interest cognoscere, quibus aut absentem sanitatem restituere, aut præsentem tueri possit. Iam vero quæ absentem restituunt: medicamenta & præsidia nominantur: quæ præsentem conseruât, salubris victus ratio. Hæc 10 igitur, & ipsam medicinam salubriû, morborumq; scientiâ esse, veterû scripta declarant. Salubria quidem vocant, tum ad præsentem sanitatem tuendam, tum ad amissam recuperandam accommoda. Morbosa his contraria 15 sunt. Amborum enim cognitio his vitandis, illis cupiendis, medico est necessaria. Vnde vero horû scientiam definierint, nondum satis inter omnes conuenit. Sed alij quidem solum vsum & experimenta satis esse pronuntiant: alij ratio non parum videtur peragere. 20 Cæterum nonnulli à professione sua nominantur. Empirici à sola experiëntia. Rationales h.j.

similiter à ratione. Atque hæ duæ principes
 medicorū sectæ sunt. vna quidem vsu & ex-
 perimentis medendi rationem inquirit: altera
 per indicationem. vtrique nomen inditū est:
 priori Empirica: secūde, Rationalis. Cæterum 5
 hanc dogmaticam, & ratiocinatricem: illam
 obseruatricem, & *μνημονευτική* græce, à man-
 dandis memoriæ quæ vsu vsurpata fuerant,
 appellare prisci consueuerūt. Hinc illarū pro-
 fessores partim Empirici, obseruatores, & *μνη-* 10
μονευτικοί euidentia memoriæ tradentes: par-
 tim dogmatici, & ratiocinatores nuncupātur.
 Porro Empirici hūc in modum ex vsu, atque
 experimentis artē constitui pronūntiant: quod
 multos hominibus affectus viderent oboriri: 15
 quosdam sua sponte, cōmunes, tū ægris, tum
 sanis, vt sanguinis fluorem ex naribus: vel su-
 dores, vel alui profluuiā: vel aliud huiusmodi
 quippiā, quod vel offensam, vel præsidium affe-
 rat: non tamen causam effectricem, quæ sub 20
 sensum cadere possit, ostendat: alios, quorum
 causa euidentis satis fuit, non tamen ex nostro
 instituto, sed casu quopiam euenire, vt colla-
 psū, ictū, aut aliter vulneratū sanguinē
 mittere, frigidā bibere in morbo, cupiditati 25
 obsequentem, aut vinū, aut id genus alia, quæ
 singulatim vel profunt, vel offendunt. Primā
 itaque speciem auxiliorum, vel offensarū, Na

turalem vocant: alteram, fortuitam. Priorem
 vero ytriusque speculationem *ᾠδὴ τῆς φύσεως* græ-
 ci nominant: inde adeo quod rebus ex impro-
 uiso, nec volentibus nobis accidat. Hæc igitur
 experientiæ species est huiusmodi. At quæ vi-
 5 tro euenit, ex nostro pendet arbitrio, cum vel
 somnijs, vel alia ducti opinione quippiã exer-
 cemus. Tertia species est imitatoria, vbi, quid
 iuuerit, aut offenderit vel natura, vel casu, vel
 suomet instinctu, statim in ipsis affectibus vsu
 10 ac experimento probetur. Atque hæc est, quæ
 artem ipsorum potissimũ constituerit. Non
 enim bis dũtaxat, aut ter, verũ sæpius id quod
 profuit, imitati sunt. Postea in eisdem vitijs
 idem valere frequẽter cõperientes, eiusq; me-
 15 moriam speculationem appellant, fidã mo-
 dõ, & medicinæ & partẽ arbitrantur. Quam-
 obrem vbi multa id genus Theoremata colle-
 gissent, vniuersam congeriem medicinã: col-
 20 lectorem medicũ appellant. Talis autẽ conge-
 ries, propria cuiusq; inspectio, græce *ἱστορία*
 est: memoria videlicet eorum, quæ subinde si-
 milique modo oculis comperta sunt. Quam
 rem experientiam nominare licet: eius profes-
 25 sionem, historiam. Nam id ipsum obseruati
 suamet inspectio est: discenti vero iam obser-
 uatũ, historia. At quia in mali genus aliquod
 nondum prius visum vel cognitum incidebāt
 h.ij.

& in ijs locis, vbi nulla esset remediorum co-
 pia, quæ vsu explorarint, instrumentum ali-
 quod auxilijs inueniendis inuenerunt, nempe
 ad similia trangressionem : qua vtentes cre-
 bro etiam ab affectu, ad affectũ similem idem
 præsidium transferunt. item à loco ad locum:
 à remedio prius cognito, ad vicinum aliquod
 transeunt. Ab affectu quidem ad affectum, vt
 si ab Erysipelate ad Herpetem trangrediaris,
 A loco ad locum, vt ab humero ad femur: à 10
 præsidio ad præsidium, vt in alui profluuijs à
 pomo ad mespilum. Atqui omnis huiusmo-
 di transitus ad inuentionem via est. Verum
 inuentio nondum ante experimentũ est: vbi
 vero eius quod speratum sit periculum fece- 15
 ris, iam certum veluti testimonio experientiae
 habetur, non minus ac si plerunq; pari modo
 valere obseruatum fuerit. Porro experientiã
 hanc similium trãsitus comitem exercitatio-
 riam vocant: quòd eam qui hac ratione quid 20
 inuenturus sit, in arte exerceri conueniat. Ac
 priores vniuersæ probationes experiẽtiã præ-
 cedẽtes, quas ars in sui cõstitutionẽ requirit,
 in quibussibet fieri possunt. Talis nãq; per vsũ
 ac probationem ad artis finem via est. Cate- 25
 rum quæ rationi nititur, corporis naturẽ cui
 mederi conatur, iubet perdiscere: adhæc om-
 nium causarum vires, quibus affectum quo-

tidie corpus aut salubri⁹, aut valetudinarium
magis euadit. Insuper aeris, aquarum, loco-
rum, studiorum, cibi, potionis, & consuetudi-
num rationē medicum percallere conuenit :
5 quò morborū omnium morbos, & remedio-
rū facultates inueniat. præterea cōijciat, ratio-
cineturque medicamentum huiusmodi facul-
tate præditum, id genus causæ adhibitum, ta-
le quippiam effecturū esse. Quia, prius quàm
10 in his omnibus variè se exercuerit, fieri non
posse aiunt, vt remediorū facultatē cōsequa-
tur. Esse videlicet, vt exiguo paradi-gmate to-
tum id condiscas, pars corporis aliqua dolens,
& dura, & cōtumax, & tumidiuscula. Hic cau-
15 sa medio inuenienda est. primum quòd hu-
mor quispiam naturali copiosior in partē de-
fluens ipsam attollat, & distendendo afficiat.
Deinde si quid influat, cohibendum est. Sin-
minus, pars iam euacuāda est. Qua igitur ra-
20 tione fluidum adhuc sistes, & quod contine-
tur vacuabis? Refrigerando sanē & astringen-
do particulam, fluorem sistes. Humectando
laxādōq; collectum vacuabis. Hoc itaque pa-
cto ab ipsa dispositione, cōueniētis indicatio-
25 nē accipiūt. Nō hanc solū esse satis aiunt: ve-
rum ab ægrotantis viribus alteram sumi: item
ab ætate aliam: nec minus à propria ægri na-
tura aliam. Pari modo ab anni tempore, loci,
h. iij.

CLAVD. GAL. PER G.

natura, studiorumque & consuetudinis ratio-
 ne peculiarem à singulis idoneorum indica-
 tionem fieri. Verbi gratia, ut hoc quoque exē-
 plo fiat dilucidius, fingam aliquem acriter
 febricitatem, ad motum segnem, gravitatem
 corporis sentire: fingamus item tumidum ma-
 gis & rubicundum esse quam prius: adhuc ve-
 nas elatiores apparere, quis dubitat sanguinis
 calidioris copiam huic redundare? Quod igitur
 remedium? nimirum euacuatio: quæ abundan- 10
 tiæ est contraria. Nam contrariis contraria
 sunt remedia. Quomodo iam euacuabimus,
 aut quousque, hoc nondum à causa sola constare
 potest. Nam vires, ætatem, tempus, regionem,
 aliæque paulo ante commemorata prius inspi- 15
 cienda sunt. Quippe si validis existat viribus,
 ætate florenti, & tempus anni vernum, & regio
 temperata: non peccabis, si vena incisa vacuus
 sanguinem: quantum causa postulet. Imbe-
 cilli autem viribus, ætate vel puero admodum 20
 exiguo, vel seni, in loco frigidore, ut Scytharum
 plaga, aut calidore ut Aethiopia: & anni
 tempore, vel insigniter frigido, vel calido:
 nemo venam incidere ausus fuerit. Similiter
 consuetudinem, studia, & naturas corporum in- 25
 tueri præcipiunt. Siquidem ab omnibus istis
 propriam curationis indicationem assumunt.
 Porro, à quibus Methodici sanationis indica-

tionē capiunt, inde Empirici obseruationem.
 Prædicta enim symptomatum congeries in
 febricitate, *συμφορη* vocare cōsueuerunt, Do-
 gmatico quidem vacuationē ostendūt: Empi-
 5 rico obseruatorū recordationē. Etenim in hu-
 iusmodi affectibus, cū euacuationē sæpe pro-
 fuisse viderit, nūc quoq; eadem vsus, de succes-
 su bene sperat. Quinetiā florētes ætate vacua-
 tionē sufficientem nulla planē molestia ferre
 10 cōspexit: ex quibus id crebro aduertit. Sic vere
 magis q̄ æstate, & in loco tēperatiore: tū si cō-
 suetudo quæpiā vacuādi ægro fuerit, nepe per
 hæmorrhoidas, vel ex naribus, Dogmaticus
 quidē hui⁹ rei occasione sanguinis abūdantiā
 15 à rei naturā incitatus adimit: Empiricus autē,
 q̄ hunc in modū obseruauerit. Sūmatim ea-
 dē remedia in eisdē affectibus & Dogmatici,
 & Empirici assumūt: de ipsoꝝ inuētiōis mo-
 do dissentietes. Qm̄ symptomata eadē in cor-
 20 pore apparētia, causā Dogmaticis indicāt: vn-
 de curationē ipsi iueniūt. Memoria vero rerū
 subinde similiter obseruatorū Empiricis. Vbi
 nullū euidēs symptoma, quod causā ostēdat,
 Dogmatici habent: ibi nō verent̄ q̄rere causā,
 25 quā p̄catartica nomināt. Vt si canis rabidus
 momorderit, aut vipera, aut aliud qd̄ eiusmo-
 di. Si qd̄ hulus ipsū nihilo magis ab alijs di-
 uersū sp̄ apparet: aut prorsus ab initio. Quippe
 h.iiij.

in rabido cane perpetuo simile ijs qui ab alio
 quopiam morfi sunt, apparet. Verum in vipe-
 ris priori tempore alijs simile: posteriore quā
 iam deterius habuerint, affectiones quædam
 perniciosæ corpori ipsorum exurgunt. Et fe- 5
 rè huiusmodi symptomata omnia, quæ à be-
 stijs virus iaculantibus proueniant, deploratæ
 salutis, à principio statim meliora, postremo
 pernitiem pollicentur. Quæ igitur proba cu-
 ratio adhibebitur? An videlicet venenū quod 10
 simul cum morfu corpori incidit euacuandū
 est? Non itaque citatrix obducenda, & vulnus
 tale subito claudendum est: sed ecōtrario mi-
 nutim omnino incidendum sæpe venit: tunc
 autē calidis, acribus, & que trahere siccarēq; 15
 virus possunt, medicamentis ob eandem cau-
 sam vti conuenit. Eadem adhibent Empiri-
 ci, non à rei ipsius natura ad ipsorum inuen-
 tionem ducti, sed vsu compertorum memo-
 res. Quemadmodum etiam in ætatibus, tē- 20
 poribus, & locis. Itaq; si iam vtrasq; inuentio-
 nis vias esse veras inuicem concederent: pluri-
 bus hic verbis opus non esset. Quoniam vero
 experientiam Dogmatici damnant: alij tan-
 quā parum sibi cōstantem: alij vt imperfectā: 25
 reliqui vt artis expertē. Rationē rursus Empi-
 rici quasi cōiecturalē, p̄babilēmq; nō autē ve-
 rā reprehendūt. Duplex vtriusq; sermo lōgusq;

nimiū protenditur, dum se mutuo accusant,
defenduntque. Nempe Asclipiades cōtra ex-
perimentorum obseruationē agens, nihil eo-
dem saepe modo videri posse: indēq; ipsam
5 parum sibi constantē, & nullius vel minimi
inventioni satis esse demonstrat. Erasistratus
simplicia in simplicib⁹ per vsum inueniri pos-
se profitetur: quippe Portulacam dentiū stu-
pori esse remedio. Non statim composita in
10 compositis itidem concedit, ratus illam non
omnino vel aliquibus inueniendis ineptam
esse, licet vniuersis vna sufficere nequeat. Hæc
sunt illorum, qui per experientiam talia inue-
niri consentiunt: sed vituperāt eandem, quòd
15 incerta vagetur ac in nullo sistat præscripto: tū
quòd longa, & amethodos, vt ipsi aiūt, id est
sine via & ratione consistat. Deinde rationa-
les professionem suā per omnia sibi constātē,
firmāque prædicāt: experiētiā contrā ve-
20 luti rem ab omni arte remotā insectātur. Vi-
cissim Empirici rationaliū dictēria reuellen-
tes, experientiam consistentem, artificiosam,
& quæ satis cuique faciat, ostendere conātur:
rationē multis adeo modis reprehendere, vt
25 ad singulas accusatiōis species Methodicis re-
spondeāt. Nam hi quum naturam corporis,
morborum omnium generationes, remedio-
rum vires cognoscere se pronuntiant, Empi-

rici cominus progressi omnia illorū criminā-
 tur, tāquam probabilia, similiq; vero tantū,
 nullam autē firmam cognitionem habentia.
 Est quum ipsorum cognitionem concedunt:
 vsum vero aliquem, nō similiter. Interim vbi s
 hunc quoq; esse permiserint, rursus superua-
 caneum affirmāt. De his sanē cōmuniter Em-
 pirici & Rationales cōtendunt. Particulatim
 de multis, iuxta eorum singula, vt in quæstio-
 nibus de latentium causarum inuentione. 19
 Nempe altera pars corporū incisionem, de-
 monstrationem & dialecticam speculationē
 commendant: instrumenta videlicet, quis ab-
 dita indagantur. Empirici nec inuenire quipa-
 piam incisiones cadauerum: nec si inueniāt, 15
 necessarias esse medicinæ: imō nec indica-
 tionem omnino subsistere, nec aliud ex alio
 cognosci posse contendunt. Omnia enim sui
 notitiam requirere: nullius autem rei natu-
 ra obscuræ vllum esse indicium, insuper nec 20
 Dialectica quamuis artem desyderare. Post
 etiam aduersus Dialecticas hypotheses atque
 diffinitiones quippiam commentantur. Ad
 hanc rerum natura latentium demonstratio-
 nem nullam omnino esse pronuntiant. Iam 25
 vero de vitiosis demonstrandi modis quibus
 Dogmatici vti consueverunt, de omniq; ratioci-
 natione nonnulla dicūt: puta hanc quod polli-

cetur inuenire non posse: vel aliam quamlibet
 artem, nec vitæ humanæ rationem in ea ver-
 fari & consistere. Porro quæ evidens ratio il-
 lis dicitur, latentium causarū inuentioni utilis
 est: sic enim vocant, quæ quidem ex sensiliū
 numero sunt, nondum tamen apparent. Nec
 minus confert arguēdis ijs, qui aduersus ma-
 nifesta quippiam audēt dicere. Pari modo ad
 indicanda, quæ in apparentibus omittuntur,
 16 tum ad sophistarum cauillos euitandos con-
 ducit. Ab evidentibus nūquam recedit, verū
 in his perpetuo versatur: non tamē hæc ratio-
 cinatio, quā Græci ἀναλογισμὸν appellāt, sed
 à manifestis incipit, ad obscura vero semper
 15 desinit: atque huius rei occasione multiformis
 est. Nam ab evidentibus ipsis, ad abdi-
 ta alia, atque alia proficiscitur. Hic modo dis-
 cordiā improbabilem concitant: qua inditio
 esse dicunt, illa non comprehendi posse. Si-
 20 quidem comprehensionis vocabulo, veram,
 stabilemque scientiam designant. Incom-
 prehensionis (ut ita dicam) inscientiam.
 Iterum incomprehensionē discordiæ impro-
 babilis causam esse aiunt: discordiam rursus
 25 incomprehensionis signum improbabilem de
 latentibus dissensionem, non de perspicuis
 enuntiant. Nam vnumquodq; hic apprens
 vera loquētibus testimonium exhibet: falsos

CLAVD. GAL. PER G.

coarguit. Hoc gen⁹ sex millia Empirici & Ra-
 tionales mutuò sibi obijciunt: curationē, qui
 in vtraq; secta legitimè exercitati sunt, in eis-
 dem affectibus eandem molientes. Cæterum
 Methodici, sic enim se ipsos nominarūt, quā- s
 doquidem non vt Dogmatici artem via & ra-
 tione quadam, græci μέθοδος appellant, artem
 administrandā esse asseuerant, non verbo te-
 nus cū alijs sectis cōtendere, sed multa quo-
 que artis opera transformare videntur. Qui 10
 neque locum affectum ad curationis iudica-
 tionem prodesse quicq; aiunt, neque causam,
 neq; ætatem, neque tempus, neq; regionem,
 neque viriū ægrotantis inspectionē vel natu-
 ræ, vel ipsius habitus. Negligunt tempora an 15
 ni, loca, & consuetudines: à solis affectionibus
 remedij indicatione petita contenti: eamque
 sufficere dicentes. Nihil autem ab his specia-
 tim, sed cōmuniter, vniuersimque statuunt.
 Atque iam communia vocant. Quæ simul 20
 ipsa particularia omnia perstringunt. Iam ve-
 ro nonnulli morborum, qui ex victus ratione
 proueniunt, nonnulli omnium sermone abso-
 luto duo communia, & tertiū aliquod mixtū
 indicare nituntur. Nominant astrictū, & flu- 25
 ens. Hic autem omne morborum genus cō-
 prehendi, aut ex vtroq; mistum esse aliquid
 arbitrātur. Cum naturalis corporum euacua-

tio minus probè perficitur, astrictiōe: cum iusto magis, fluore: quū resoluitur corpus & comprimitur, mixtum vitiū nomināt. Quē admodum in oculo inflammatione simul & fluore laborante. Etenim phlegmonē astrictā licet affectū, quoniā nō sola modo, sed cū fluore in vno eodēque loco accidit, vniuersum morbum compositum generare. Auxilij indicationem statim si corpus astrictum est, digerendum esse: si profluuiū laborat, continendum. Genu nāq; si inflammationem sentiat soluendum: ventriculū, vel oculum profluentem, comprimendū tenendūq; esse præcipiūt. Si mixtum vitium habet, occurrendum subinde vehementiori malo quā alteri. Cur igitur nō Dogmaticos se nuncuparunt, cum indicationi præsidia tribuant? Quia, inquiūt, illi in coniectura rerum latētium volunt esse medicinam: nos autem in manifestis versamur. Denique ita sectā suā vniuersam definiunt, communium, quę explorari possunt, id est euentium cognitionē. Et ne alijs omnibus artibus eadē cōueniat diffinitio, etenim & illas communitatum apparētium notitias esse iudicant, ideo apponunt medicinę finem consequentium. Quidam illorum non consequētium, sed ipsius fini consonantium adiecerunt. Complures vtrisque additis, metho-

dum esse aiunt manifestarum communita-
 tum, concordantium, & consequentium me-
 dicinæ finem, notitiam. Nōnulli sicut Thes-
 salus quoque, cohærentium, & necessariarum
 ad sanitatem. Atque hæc iam est ratio, cur se
 Dogmaticos appellari nolint. Quippe laten-
 tibus ac obscuris se non indigere, vt illi profi-
 tētur: neque experimenta tantum spectanti-
 bus annumerari volunt: etsi quàm maxime
 in euidentibus artem tractent. Nam indica- 10
 tione ab ipsis separati sunt: nec tamen in ipso
 circa euidentis exercendi modo se cum Empi-
 ricis conuenire dicunt. Illos enim ab obscuris
 tanquam incertis, & dubijs recedere se vero
 quasi ab inutilibus. Præterea Empiricos in 15
 apparentibus obseruationem, ipsos indicatio-
 nē habere. Hoc itaq; discriminē cum vtrisque
 se habere docent: maxime dum anni tempo-
 ra, ætates, & hoc genus vniuersa tollunt: quæ
 nullū planè vt ipsi putāt, medicinæ vsum ex- 20
 hibēt: solū vero priorib⁹ medicis ostentatiōis
 gratia plurimi sunt æstimata. Et hoc sum-
 mum Methodicæ sectæ bonum esse prædicāt.
 Quinetiam ob hoc gloriantur, seque ad mira-
 tione dignos cēsent. Insuper eum qui vitam 25
 esse breuem, longam vero artem dicat, erres-
 pant. Econtrario namq; artem esse breuem, vitā
 longam. Siquidē omnibus quæ artem iuuat

re falso putata sunt, ablati, & ad sola cōmunia nobis respicientibus, neq; longā adhuc medicinā, neq; difficilem, sed facillimam & perspicuā esse, quæ tota sex mēibus promptissime perdisci queat. Hoc pacto morbos, qui victus ratione sanantur vniuersos, in arctū nimis cōgestos esse: similiter, qui ex manu, & medicamentis auxiliū capiūt. Quin in illis quoq; generatim quædā cōmunia adinuenire student: 5
10 adhuc remedium scopos, numero paucos subiungūt. Vnde mihi non in decantatis illis sex mēibus, sed multo etiā citius tota illorū ars percipi posse videtur. Atq; gratia illis habenda est de tam cōpendiosa disciplina, si nō mē-
15 tiuntur. Mentientes autem negligentia mihi accusandi sunt. Porro quā iuste quispiam iudicare mihi videatur, ipsos vel hallucinari in vtilibus, vel solos superuacua rectē fugere, iam aperiam. Non etenim exigua esse cōside-
20 ratio apparet, neq; ad vsq; verba tātū procedere, quēadmodū Empiricis, & Dogmaticis: cū de prima auxiliorū inuentione cōtendunt, de presenti vsu inuicem cōuenientes. Verū Methodicā sectā vel artis opera multū offendere,
25 vel iuuare multum necesse est. Cū iam duplex in rebus iudiciū sit, vnum à ratione sola, alterū ab euidenter manifestis profectum; prius maius est, quā medicina cādidatis cō-

ueniat. Quare de hoc dicere nūc opportunū
 non est. Alterum, quod in sola euidētia con-
 sistit, omnium hominū communis est. Quid
 igitur prohibet hac priore vti quæ simul & re-
 cens initiatis sit manifesta, & ab ipsis Metho-
 dicis commendata? Nihil enim aliud quā
 apparentia semper laudibus extollit: atq; hæc
 vbiq; profitetur: obscura vero omnia in nul-
 lo usu esse referunt. Age nunc primū causas
 euidētes Græci *περὶ κατὰ ῥητικὰς* nomināt, in-
 spiciamus: pro iudicij regula, id quod sensibus
 apparet, constituentes. Primūque Methodi-
 cus in mediū progressus hūc in modum lo-
 quatur. Quid tandē ò Rationales & Empirici
 frigus, æstus, ebrietatē, crudelitatem, plenu-
 dinem, defectum, labores, otia, ciborum qua-
 litates, & consuetudinum mutationes frustra
 tam curiosè inquiritis? Vtrum hæc affectioni-
 bus corporum neglectis medicaturi estis quæ
 nequaquam adsunt, verum separātur? Quod
 ab ipsis generatum est in corpore manet. At-
 que huic (affectus enim est) remedium exhi-
 bere oportet. Inspiciendum igitur est, qualenā
 existat. Si etenim cōpressus morbus, soluē-
 dum corpus est: si fluēs, tenendū: tractādū-
 que prout causæ postulant. Quem nūc usum
 adhuc causa præbet, cum fluidum solutione
 nunquam indigeat, neque astrictum reten-

sione: indubie nullū, sicut res ipsa indicat. Si-
 milia de cōiūctis, siue cōtinētibus causis Me-
 thodici loquūtur. Nā illas quoq; superuacuas
 esse asserūt, morbo videlicet propriā curatio-
 5 nem indicante, etiā causa, quæ ipsum fecit in-
 cognita. Eodem dicendi modo ad anni tēpo-
 ra, ætates, & loca descendunt. Atq; hic veteres
 medicos rem tam clarā ignorare demirātur.
 Nā phlegmone, cū morbus sit cōpressus, in-
 10 quiunt nō æstate si contingat, soluentibus au-
 xilijs opus habet: Hyeme alijs quibusdā: sed
 in vtroq; tēpore eisdem. Neq; in pueritia re-
 laxantibus: in senectute tenentibus. Neque in
 Aegypto resoluētibus: Athenis cōtinētibus.
 15 Rursus, cū phlegmonæ fluens morbus adsit,
 nunq̃ soluētib⁹, verū perpetuo reprimētib⁹,
 & hyeme, & æstate, & vere, & autūno, cuius-
 cūq; etiā ætatis æger siue in Thracia, vel Scy-
 thia, vel Aethiopia cōtingat. Quare hæc nusq̃
 20 vsu venire, verū nequicq̃ omnia tā curiosè in-
 uestigari. Quid iam corporis partium inspe-
 ctio, & hæc ne ad curationis indicatiōē su-
 peruacua est, & inutilis? Quisquā ne audeat
 dicere inflammationē, quā Græci φλεγμονή
 25 appellant in neruosa parte soluendā esse, in ar-
 teriosa, aut venosa, aut carnosa cōprimēdam?
 An omnino tam impudens quispiam sit, qui
 astrictā corporis partē non digerendam esse,

i.j.

profluuiio laborantem non continendam di-
 stitent. Si igitur partis natura nihil curatio-
 nis modum immutat, sed auxilia ex affectus
 genere inueniuntur, quorsum attinet parti-
 cularum contemplatio? At Methodicus qui- 5
 dem talis est, vt formula quadam loquendi
 vtar. Accedit nunc huic secundus Empiricus
 hunc in modum inquires. Ego quidem eui-
 dentibus nihil noui præstātius maiusq; esse,
 nec sapientius quippiam, ijs quæ oculis vsur- 10
 pavi, inueniri posse promitto. Si quidem eui-
 dentiā vilipendis, quemadmodum prius ali-
 quem sophistam me audire memini, ad eos
 qui euidētia sectātur, magnāmq; ipsius ratio-
 nē habent, hinc facessere tēpestiuū nobis vi- 15
 detur. Tu sanè Cadmeam victoriā celebrabis.
 At si, vt ab initio abs te audiuius, cuiuslibet
 obscuri nullū esse vsum dices, euidētia solū cō-
 secutus, forsan ostendero in manifesti mētio-
 ne, quod tu præteristi. Homines duo à rabio- 20
 so cane morfi, ad Medicos familiares sibi, re-
 media petituri concesserunt. Sed exiguū adeo
 vtriusque vulnus erat, vt ne cutim quidem
 totam penetraret. Alter itaq; medicorum so-
 lius vulneris curationem moliebatur, de nul- 25
 la re alia sollicitus: & quidem paucis diebus
 partem sanam reddidit. Alter vero, cum rabi-
 re canem deprehendisset, contrarium à prio-

re semper egit, vulnus multo maius faciens:
validis diu, acribusque medicamentis vsus, tū
pharmaca interim aduersus rabiem confecta,
vt ipse dicebat ægrum assumere coegit, tan-
5 tum abest, vt cicatricem vulnere statim in-
duxerit. Tu nunc quē vtriusque curatio euen-
tum habuerit, audi. Qui medicamenta bibit,
sanitati pristinae restitutus est. Alter, qui nihil
se mali habere putabat, subito aquam exti-
10 mescens conuulsione interiit. Nunquid hic
præcedens causa in ijs superuacuo tibi inqui-
sita esse videtur? An ob aliam ille mortuus
est, quàm medici negligentiam, qui nihil de
morbi causa sciscitatus sit, neque remedium
15 ad eam obseruatam administrarit? Hac sola
meo quidem iuditio, causa mortis illius exti-
tit. Quoniam vero manifesta sector, id genus
causarum nullam præterire non possum. Pa-
ri modo nec ætatem omittere, aut paruifa-
20 cere manifesta. Nam hæc quoque mihi fidem
faciunt, eosdem planè affectus, non eandem
semper curationem requirere. Sed interim in
diuersis ætatibus tantum differre, vt nō quan-
titate solum, vel modo auxiliorum, sed toto
25 genere euariant. Vidi nanque sepius multis
ætate florentibus, & rabidis: etiam me cōsul-
tore sanguinem missum, verum nulli vel se-
nio planè confecto, vel adhuc puero admodū.
i. ij.

CLAVD. GAL. PERG.

Nec vos ausi estis venam incidere, nec vllus
 alius vnq̃. Quid autem sibi vult Hippocrates,
 quū ait: Sub canicula, & ante eā purgationes
 malæ. rursus. Aestate superiores, per hyemē
 inferiores partes expurgare cōuenit. Verē, an
 secus nobis dicere videtur? Ad vtrunq̃ enim
 quid respōdeatis, non habere vos arbitror. Nā
 si mentiri eū dixeritis, euidentia minus æsti-
 mabitis, quæ vobis in pretio esse fingitis. Ve-
 ritas siquidē vt Hippocrates scribit, apparet. 10
 Sin autē vera loqui eū censeatis, tēpora quo-
 que, & loca, quæ superuacua esse cōtendistis,
 admittetis. At puto vos nunquā à patria ve-
 stra longe peregrinatos esse, neq̃ locorum di-
 uersitatem vsu didicisse. Sciretis utiq̃ eos, qui 15
 Septentrioni subiacent vniuersim factas eua-
 cuationes sufferre nō posse, sicut nec illos, qui
 Aegyptum, aut Meridanam plagam incolūt.
 Qui vero medij hos interiacent, ijs venæ in-
 cisionem sæpe magno fuisse præsidio. Porro, 20
 quòd nec corporis partes inspicitis, non pos-
 sum non demirari, vehemētérque absurdum
 est: nec veris modo, sed etiam illis, quæ vos
 met agitis contrarium. Quæso per deos, si
 phlegmone contingat vel in crure, vel in au- 25
 re, vel in ore, vel in oculo, eadēne erit cu-
 rādi ratio? Cur nam igitur crurum phlegmo-
 nas scalpello vos diuidentes crebro conspexi,

oleoque vngētes: oculos nō item? Hos etenim
phlegmone laborātes astringentibus medica-
mentis curatis, nō tamen eisdem crura perun-
gitis? Cur non itidem aures inflammatione
5 vexatas oculorū auxilijs sanatis? Cur nō ocu-
los, auriū præsidijs? Sed aliud auriū, aliud ocu-
lorum inflātionis medicamē est. Acetum
siquidem cū oleo rosaceo auriū phlegmonæ
præsens est remediū. Neminem tamen puto
10 idem exhibiturū oculis inflāmatis. Quod si quis
tam sit temerarius, nō mediocri offensa certo
noui temeritatem suā experturū. Et gurgu-
lioni phlegmone obsessō pulchrē succurrit
spinæ Aegyptiæ fructus, sic quoque alumē fissi-
15 le. Num igitur hæc quoque oculis inflātionis
obnoxijis, & auribus profuerint? An plane è cō-
trario magnū detrimētum attulerint? Atque
hæc omnia dico, primā vobis hypothesin cō-
cedēs, crurum videlicet, & manuū phlegmo-
20 nas digerendas esse: nec tamē oculorum, aut
gurgulionis, aut auriū. Iam vero si crurū ma-
nuūque inflātionem non quouis modo la-
xandas esse monuero, forsan in mentē vobis
veniet, si sapiatis, quantū à scopo aberraueri-
25 tis. Erit autē præsens sermo manifesti cōme-
moratio. Qui enī ex nulla re, sed vltro in par-
te quacūque inflātionē sortiūtur, vbi pletho-
rica adsit affectio, nullā particulę relaxationē,
i. iij.

prius desiderant quàm corpus euacuatum sit.
 Nō enim phlegmonen præsentiē, si id feceris,
 imminues, sed potius augebis. Quo fit, vt hu-
 iusmodi tempore astringentia refrigeratiāq;
 parti admoueamus. Simulatque vero totum s
 euacuauerimus, tūc particula sustinebit laxā-
 tia. Sin autē hęc vobis nō persuadeo quod in
 orationis exordio diximus, ad illos, quib⁹ ma-
 gnifiūt euidentia digredi nos tēpus postulat.
 Hęc Empirico cōmemorante, Dogmaticus 10
 accedat, & hūc in modum orationē instituat.
 Nimirū si quid mentis haberes, hęc abunde
 satis te erudirent, nec ætatē, nec loca, nec cau-
 sas præcedentes, nec corporis partes frustra
 disquiri. Cæterū si nondū Empiricus eviden- 15
 tiū enarratione hoc tibi persuasit, sed alia ad-
 huc oratione opusest, eā apponere nūc cogito,
 quò sectæ tuæ hypothesin infirmā esse de-
 monstrem. Audio enim sectā vestram apparē-
 tium cōmunitatum esse cognitionem. Inter- 20
 rogavi autem crebro, in qua re potissimū ipsa
 cōmunitas consistat, quóque modo eam co-
 gnoscamus. Siquidē cognoscere me etiānum
 posse non videor. Causam verbotenus eandē
 omnes tractatis, re vero nō consentitis. nōnul 25
 li enim vestrū excretionibus præter naturam,
 astrictū & fluens adnumerāt. Cū quidem re-
 tinētur excremēta, obstructionē: quū immo-

derate excernuntur, profluuiū, affectionē ap-
pellant. Alij quidam è vestro cœtu inter re-
liquas corporum constitutiones affectus esse
pronuntiant, querunturq; de ijs vehementer
5 qui ad corpus, quod euacuatur, respiciunt. At
quomodo mihi vtraq; pars errare videat̃, for-
tassis iam ostēdero. Ad eos autē sermo noster
prius dirigatur, qui excretiōibus præter natu-
rā, affect⁹ attribuūt. Nā demiror ipsos, si ne-
10 que sudores vnq̃, neq; vrinas, neq; vomitus,
neq; deiectiones plures quā naturalis habit⁹
exigit in morbis cōmode vacuatis viderūt: &
quod lōge absurdissimū est, si neq; ex naribus
fluore aliquando morbū finiuisse cōspexerūt.
15 Huius siquidē nō modo qualitas, sed totū ge-
nus à natura recedit. Sudorū, vrinarū, & eorūq;
per aluū, & vomitū proruūt genus, nō præter
naturā est. Sic tamē immodica est interim co-
pia, vt ego viderim nōnullos tātū sudorē pro-
20 fudisse, vt etiā culcitrās madefecerūt: alios rur-
sus supra heminas triginta per sedē deiecisse.
Sed nihil horū videbat̃ cessare, quia id, quod
offendebat, euacuabat̃. Etsi hæc symptomata
naturalibus excretionib⁹ regula vtēti euitāda
25 erant. Quamobrē probabiliores quodāmodo
esse videntur, qui in corporum statibus com-
munitates statuunt. Sed hos quoq; demiror,
quomodo nō apparētes eas appellare dubita-

i. iij.

uerint. Nam si quid ex aluo profluit, non est
 fluxus, verū corporis affect⁹, ex quo ipsum est
 fluēs, nulli autem sensui hic apparere potest,
 qua ratione adhuc cōmunitates dixeris cui-
 dētes? In colo enim, & tenuioribus intestinis, 5
 & ieiuno, & ventre, & meseræo alijsq; multis
 intestinis, quorū nulla, aut affectiones in ipsis
 sensu deprehendi possunt, profluuiū esse con-
 tingit. Qua igitur fronte cōmunia dixeritis
 apparētia, nisi quod signis innotescere queat, 10
 id apparens seu euidens quispiā vocare volue-
 rit. Si hoc ita est, quonā discrimine à veteribus
 medicis adhuc different, ignoro. Quomodo
 rursus statim & in semestri artem se docere
 promittunt? Etenim nō methodus exigua, ad 15
 alicuius quod sensum effugit, cognitionē desi-
 deratur. Quinetiam anatomes vsus pulchre
 hoc administranti necessarius est, vt quæ par-
 tis cuiusque interioris naturā edoceat. Adhæc
 naturalis speculationis haud parua, qua par- 20
 tium singularium munus, & vsum inspicias.
 Prius q̄ enim hæc inueneris, nullius in alto
 sitæ particulæ affectū licet cognoscere. Quid
 opus est verbis? hic dialecticæ vsus necessarius
 est, vt ex quo quid colligitur cōprehēdas: nec 25
 sophismatibus circunueniaris aut ab alijs, aut
 abs te ipso. Quoniā interdum nobismet vel
 inuitis illudi, videre licet. Atqui profluuium,

quid sibi velit, lubēs ex eis quærerem, si disse-
rendi facultatem didicissent. Nō enim hoc so-
lum credo satis esse, quod à quibusdam illorū
dictū est, profluuiū, videlicet affectionē nomi-
5 nari, naturæ contrariā. Quippe nisi quid sit
affectio teneamus, nihil amplius adeo cogno-
uerimus, An relaxatio, aut mollities, aut rari-
tas sit. Nihil siquidē vel ipsis dicētibz mani-
festi audies. Sed quod ipsis in mentē venerit,
10 nūc hoc, nunc illud, plerunque simul omnia,
tanq̃ nihil differētia. Qz si quis ipsos, quomo-
do hæc inter se variēt, quodq; singula propriā
requirāt inspectionem, docere conetur, eum
nullo pacto audire sustinēt, sed veteres ince-
15 sunt caluniātūrq; tanq̃ frustra huiusmodi dif-
finiētes. Tam otiosi ac segnes in veritatis in-
quisitione reperiūtur. Imò nec quod laxo ten-
sum, molli durū, raro densum existat contra-
riū, dicere nos patiūtur. Insuper ad hæc om-
20 nia, aliud esse naturæ excretiones contineri,
aliud fluere, quēadmodū ab Hippocrate etiā
vniuersa hæc definita sunt: verū temere, nullo
iudicio, & clausis oculis de his sententiā pro-
ferunt: & phlegmonē (sic autē vocant durū,
25 renitentē, dolore plenū, & calidum tumorē)
prompte admodū, & incōsulto affectum esse
astrictū pronuntiāt. Deinde porrò phlegmo-
nas alias nominant implicitas, velut oculorū

inflāmatiōes, vbi cū fluore fuerit, tōsillarū, gur-
gilionis, palati, & gingiuarū. Postea subiūgūt
meat⁹ alios raros, alios patētes: ideo vtrosq; iā
esse affectos. Quosdā vero nō pudet dicere, in
vno eodēq; meatu & fluorē, & astrictiōē pos-
se consistere, quod ne quidē cōsiderare facile
est. Tā sunt in ōni re audacter temerarij, At
pauci quidā ex ipsis, vbi paulo copiosi⁹ de his
omnibus tū audire, tum disceptare pro virib⁹
sustinuerint, vix tādē pœnitētia ducti ad veri-
tatē se cōuertūt. His igit̃ qui accuratius de pri-
mis, & generalib⁹ vitijs cupiūt discere, seorsū
cōmētarios scripsimus. Porro vt præsens recē-
tioribus medicinæ cādidas, frugē aliquā ad-
ferat, pauca aduersus eos dicere, æquū fuerit. 15
Optarē sanē illos fructū aliquē inde referre.
Referrēt haud dubie, si cōtentiōe relicta, ser-
monē ipsum apud se paulisper examinarent.
Sermo ita habet. Phlegmone, vt ipsi vocāt, tu-
mor est præter naturā, dolorē pariens, durus, 20
tactui resistēs, & calidus: nullam magis partē
pro sua ipsius portiōe vel rariorē q̃ fuit antea,
vel duriorē, vel densiorē reddēs, sed humore
superfluo repletā, eoque intēsam. Non tamē
si quid omnino tensum est, id quoq; densius, 25
aut durius, ac antea euadit, discas hoc in co-
rijs, loris, & crinibus, si vehemēter distende-
re coneris. Pari ratione humorū qui inflam-

matam partē occuparunt remediū est euacua-
tio. Hæc enim repletioni cōtraria est. Nā eua-
cuatis humoribus, particulæ statim laxiores
fiūt. Tēsio certe repletas necessario sicut rela-
5 xatio euacuatas sequitur. Densitas autē, vel ra-
ritas, neutrū ex necessitate comitatur. Quin
nec fluor, vel retentio. Neq; enim si rerū iam
quippiā, id inde fluere prorsus necessitas po-
stulat. Nā quid, si quod cōtinetur, crassum, &
10 modicū fuerit? Neq; si densum, teneri? Quia
copiosū, & tenue etiā per dēfos effluit meat⁹.
Sati⁹ igit ipsos ex veterū libris relectis didi-
cisse, quot modis id quod pri⁹ in particula cō-
tinebat, denuo excernitur. Etenim rarescēte,
15 quod ipsum cōtinet, & eo quod cōtinet, atte-
nuato, maiorēq; reddito, & vehemētī⁹ moto,
tū ab exteriorū aliquo attracto, vel impulso,
& velut à quibusdā resorpto. Iā vero si quispiā
his omnib⁹ neglectis vnā vacuatiōis causam
20 meatuū raritatem esse putauerit, is ne appa-
rētia quidē cognoscere videbitur. Nam lanā,
vel spōgiā, vel huiusmodi rarū quippiā mani-
festō videmus, si parū intus in se humoris ha-
beāt, retinere id, nec dimittere: si multū refun-
25 dere. Cur igit nō de oculis quoq; & narib⁹, &
ore, alijsq; nō min⁹ raris id ipsū cōsiderarūt, nē
pe fieri possē, vt in hūoris, q̄ ipsis inest copia,
nūq; nisi ob meatuū raritatē quippiā effluere.

CLAVD. GAL. PER G.

Enimuero figulares ollas subinde videmus
adeo raras, vt aqua in eas infusa, perfluat: non
perinde mel. Crassior etenim mellis substātia
est, ollæ meatibus. An igitur vero dissimile
erat, si frequēter tenuitatis causa quid efflue- s
re dixerim, licet corpus ipsum cōtinens à na-
tura perforatum nō sit? Quoniā vero natura
sæpius quæ animal gubernat, impetu vehe-
mentiore vsa omne superuacuum expurgat,
quasi expellens propulsansque, quæ tandem 10
difficultas est in artis operibus diligēter ver-
sato diu, hoc intelligere? Quippe morborū in-
dicationes hac ferè ratione fiūt. Prætereo nūc
reliquis euacuationum causas. Similiter, re-
tentionum, pares numero, his contrarias. Nō 15
enim hic sermo magnam cōmoditatē osten-
deret. Quod autē profuturū aliquando putē,
eò reuertor: nempe oculū interim posse flue-
re, vel humore copioso, vel tenui reddito, vel
à natura per hanc partem expulso, nihil ipsis 20
corporibus supra naturalem habitum magis
immutatis. Oportet sanè tenuem humorem
spissare, crassum attenuare. Naturæ impetū,
si in tempore contingat, excipere, nihil circa
oculorum corpora ipsa molientem, vt quæ 25
fluoris causam non præbuerint. Cæterum aliā
Phlegmonem astrictum esse affectum arbi-
trari, aliam implicitam, insignis est demen-

tia. Quandoquidem primum orationis suæ oblitī sunt, fluens non euacuatione æstimandum esse, nec retētionibus, astrictum: verum ad ipsas corporū dispositiones respiciendum.

5 Cum itaque similes omnino inter se existāt, & nulli præsens phlegmone à priori differre videatur alio nomine, q̄ quòd ex his quippiā defluit, ex illa nō: quomodo nō insigniter absurdum est aliam phlegmonem implicitam,

10 aliam astrictam nominare? Deinde quo pacto nec hoc, quod erat promptissimū illis in mentē venit ratiocinari, nec in manu videlicet, nec in pede, nec in brachio, nec in humero, nec in tibia, nec in femore, nec in alia quolibet corporis parte talē aliquādo phlegmonē

15 speciē, qua foras aliquid efflueret inuentam esse. Solis autem, quæ os, oculos, & nares instant, hoc euenire. Vtrum Iuppiter omnibus implicitis comunitatibus instituit, vt earum

20 nulla vnquam in aliā corporis partem se immittat, quā oculos, nares, & os? Phlegmone siquidem omnia potest occupare, quæ eius generatiōis causæ recipiēde sunt idonea. Videas enim quædam rara, quædam densa natura:

25 alia fluere, alia astringi. Nā si utrē, vel aliud quid ita obstructū humida substātia repleas, nihil diffluet. Si vero spongiam, aliudq̄ id genus rarū, quicquid est superflui, effundetur.

CLAVD. GAL. PER G.

Quid negotij ergo est si cognoscas, quanto
 omnis alia pellis sit astrictior, ea quæ oculos,
 nares, & os contegit, particularū naturæ cau-
 sam attribuere, multis verborū ambagibus,
 & nugis omissis. Quod enim hoc sic habet, s
 innuunt cum exulceratione in alijs particulis
 factæ inflammationes. Quia inter illas quæ
 tenerior est, fluitat, quæadmodum in oculis,
 naso, & ore. Donec autem cutis inoffensa &
 astricta prorsus fuerit, eius quod nihil refun- 10
 dit, hæc causa, non phlegmonæ species est. Itē
 si melle, aut pice liquida, non autē immode-
 rate spongiam aut lanā humectes, nihil pro-
 pter liquida crassitiem effluit. Porro si aqua,
 vel eius generis alio, eoque minutissime ea- 15
 dem arbitror ratioe ex oculis nō vsquequaq;
 aliquid profunditur, aut ppter humorū cras-
 sitiem, aut quod nō redundāt, vt qui secundū
 naturā maxime sint cōstituti. Quare eadem
 phlegmone species non alia re discrepans, q̄ 20
 substantia influētis crassitie, lippitudinē, siue
 fluxū generare potest: quā sapientissimi Me-
 thodici astrictā nomināt creduntq; cum im-
 plicita, huic esse discrimē, verborum suorum
 obliti, quæ sursum, & deorsum trāsserūt, cor- 25
 pareas affectuum, præparatiōes esse, nō in hu-
 moribus consistere autumantes. Quonā igitur
 pacto cum in corporibus eadem sit dispositio,

nulla re alia differens, solam vero humorum
 tenuiū, vel crassorū naturā, sequatur interim
 alicuius fluor, interim retētio, diuersas esse cō
 munitates existimatis? Haud secus implici-
 5 tum vestrum à sensu alienū est. Quantū iam
 particulatim nō solum in ea medicinæ parte,
 quæ victu curat, sed etiam quæ manu, & quæ
 medicamentis medetur, delinquatis, iterum
 forsan discetis, si ijs nōdū fidem adhibeatis. In
 10 præsentia vero, quoniā hac medicinæ recens
 initiatis sufficiūt, libro huic finem imponā.

Errata sic corrigito.

Foliū. Pagina. Linea

3	I	13	lege consistunt.
3	I	14	extrinsecus incidēs sinio plex est.
12	I	14	dele nomen
16	I	5	κευσαλλοειδής.
49	I	17	capiendis.
50	2	20	eum
51	I	5	causas pro morbos lege
51	I	12	Esto.
51	I	16	aliam
51	2	I	in ijs
52	2	12	cicatrix.
54	2	11	indicationem.
55	I	19	manifestis
56	2	7	extollunt.
60	2	I	quod.

177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200

Index of contents

Page	Page	Page
1	2	3
4	5	6
9	10	11
14	15	16
19	20	21
24	25	26
29	30	31
34	35	36
39	40	41
44	45	46
49	50	51
54	55	56
59	60	61
64	65	66
69	70	71
74	75	76
79	80	81
84	85	86
89	90	91
94	95	96
99	100	101
104	105	106
109	110	111
114	115	116
119	120	121
124	125	126
129	130	131
134	135	136
139	140	141
144	145	146
149	150	151
154	155	156
159	160	161
164	165	166
169	170	171
174	175	176
179	180	181
184	185	186
189	190	191
194	195	196
199	200	201

